


mahasenovic@gmail.com

الامتحان

2019



الطبعة
الشطرنج
العملية
العلمي
الطباطبائي

الطباطبائي

إعداد
صابر حكيم

محتويات الكتاب

الكيمياء الحرارية

الباب
الرابع



1 المحتوى الحراري.

الدرس الأول | من الطامة.
ما قبل المحتوى الحراري.

الدرس الثاني | من المحتوى الحراري.
نهاية الفصل.

2 صور التغير في المحتوى الحراري.


التغيرات الحرارية المصادبة للتغيرات الفيزيائية والكيميائية.

ما قبل التغيرات الحرارية المصادبة للتغيرات الكيميائية.

التغيرات الحرارية المصادبة للتغيرات الكيميائية.
نهاية الفصل.

الكيمياء النووية

الباب
الخامس



1 نواة الذرة و الجسيمات الأولية.

الدرس الأول | من مكونات الذرة.
ما قبل القوى النووية القوية.

الدرس الثاني | من القوى النووية القوية.
نهاية الفصل.

2 النشاط الإشعاعي و التفاعلات النووية.

الدرس الأول | من التفاعلات النووية.
ما قبل تفاعلات التداول الصناعي للعناصر.

الدرس الثاني | من تفاعلات التداول الصناعي للعناصر.
نهاية الفصل.

الكيمياء الحرارية



المحتوى الحراري.

الفصل 1



صور التغير في المحتوى الحراري.

الفصل 2

أهداف الباب

بعد دراسة هذا الباب يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :

- (١) يميز بين المفاهيم و القوانين الأساسية في الكيمياء الحرارية.
- (٢) يطبق العلاقة التي تربط بين كمية الحرارة و الحرارة النوعية و التغير في درجة الحرارة.
- (٣) يفسر التغير في المحتوى الحراري (الإنثالبي المولاري) المصاحب للتفاعلات الكيميائية.
- (٤) يفسر التغير في المحتوى الحراري المصاحب للتغيرات الفيزيائية المختلفة.
- (٥) يقارن بين أمثلة التفاعلات الطاردة و التفاعلات الماصة للحرارة.
- (٦) يطبق شروط المعادلة الكيميائية الحرارية.
- (٧) يطبق العلاقة بين طاقة التفاعلات الكيميائية و نوع التفاعل (طارد أم ماص للحرارة).
- (٨) يستخلص التغير في المحتوى الحراري المصاحب للتغيرات الكيميائية من خلال البيانات المعطاة.

1

المحتوى الحراري

أهم المفاهيم

- قانون يقان، الطاقة.
- علم الكيمياء الحرارية.
- علم الديناميكا الحرارية.
- النظام.
- الوسط المحيط.
- النظام المفتوح.
- النظام المغلق.
- النظام المعزول.
- القانون الأول للديناميكا الحرارية.
- الشعر.
- الجول.
- الحرارة النوعية.
- المحتوى الحراري.
- التغير في المحتوى الحراري.
- المعادلة الكيميائية الحرارية.
- التفاعلات الطاردة للحرارة.
- التفاعلات الماصة للحرارة.
- طاقة الرابطة.

الدورة
ما قبل المحتوى الحراري

الدرس الأول

المحتوى الحراري
نظام المحتوى

الدرس الثاني

نواتج التعلم

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :

- (١) يستنتج العلاقة بين علم الكيمياء الحرارية و علم الديناميكا الحرارية و قانون يقان، الطاقة.
- (٢) يقارن بين النظام المفتوح و النظام المغلق و النظام المعزول.
- (٣) يفرق بين الحرارة و درجة الحرارة.
- (٤) يحسب كمية الحرارة المكتسبة أو المفقودة في الأنظمة المختلفة.
- (٥) يحدد صور الطاقة المحتزبة داخل المادة.
- (٦) يحسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الكيميائي.
- (٧) يعبر عن التفاعل بمعادلة كيميائية حرارية.
- (٨) يقارن بين التفاعلات الماصة للحرارة و التفاعلات الطاردة للحرارة.
- (٩) يستنتاج العلاقة بين طاقة الرابطة والتغير في المحتوى الحراري لتفاعل الكيميائي.

أهم العناصر

• الطاقة.

• علم الكيمياء الحرارية :

• النظام و الوسط المحيط.

• القانون الأول للديناميكا الحرارية.

• الحرارة و درجة الحرارة.

• حساب كمية الحرارة.


• الفسّر الحراري.

• المحتوى الحراري.

• المعادلة الكيميائية الحرارية.

• التفاعلات الطاردة و التفاعلات الماصة للحرارة.

• طاقة الرابطة.



الطاقة

* للطاقة أهمية كبيرة في حياتنا حيث لا نستطيع القيام بالأنشطة المختلفة (ذهنية، عضلية) بدون الطاقة الناتجة من احتراق السكريات داخل أجسامنا.

قانون بقاء الطاقة

* للطاقة صور متعددة، منها :

- الطاقة الكيميائية.
- الطاقة الضوئية.
- الطاقة الكهربية.
- الطاقة الحركية.



القيام بالأنشطة العضلية
يتطلب طاقة

* ورغم التعدد في صور الطاقة والتي تبدو كل صورة منها وكأنها مستقلة بذاتها عن باقي الصور، إلا أنه توجد علاقة بين جميع صور الطاقة حيث يمكن أن تحول الطاقة من صورة لأخرى، وهو ما يعبر عنه قانون بقاء الطاقة.

قانون بقاء الطاقة

الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، لكن يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى.

علم الكيمياء الحرارية

- اتحاد غازى الهيدروجين والاكسجين لتكوين الماء يعتبر تفاعل كيميائى.
- ذوبان ملح نترات الأمونيوم فى الماء يعتبر تغير فيزيائى.

* يختص علم الكيمياء الحرارية بدراسة التغيرات الحرارية المصاحبة لتفاعلات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية، ويعتبر هذا العلم أحد فروع علم الديناميكا الحرارية.

علم الكيمياء الحرارية

فرع من فروع الديناميكا الحرارية يختص بدراسة التغيرات الحرارية المصاحبة لتفاعلات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية.

علم الديناميكا الحرارية

العلم الذي يختص بدراسة الطاقة وكيفية انتقالها.

* ومن المفاهيم الأساسية المرتبطة بالكيمياء الحرارية :

القانون الأول للديناميكا الحرارية.

النظام و أنواعه.

الدرارة النوعية.

الدرارة و درجة الدرارة.

النظام و الوسط المحيط

النظام

أى جزء من الكون يكون موضعًا للدراسة، تتم فيه تغيرات فيزيائية أو تفاعلات كيميائية.

* يمكن التعبير عن التفاعل الكيميائي كنظام، كما يلى :



العلاقة بين التفاعلات الكيميائية و الطاقة

* معظم التفاعلات الكيميائية تكون مصحوبة بتغير في الطاقة (فقد أو امتصاص طاقة)، وذلك عن طريق تبادل الطاقة بين وسط التفاعل (النظام) والوسط المحيط به.

أنواع الأنظمة

* تصنف الأنظمة تبعًا لقابليتها لتبادل الطاقة والمادة مع الوسط المحيط إلى :


نظام معزول

النظام المعزول
النظام الذي لا يسمح بتبادل أى من المادة أو الطاقة مع الوسط المحيط.




نظام مغلق

النظام المغلق
النظام الذي يسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط المحيط على هيئة حرارة أو شغل.



نظام مفتوح

النظام المفتوح
النظام الذي يسمح بتبادل كل من المادة والطاقة مع الوسط المحيط.



قارن بين النظام المفتوح و النظام المغلق و النظام المعزول.

الأشكال التالية تمثل ثلاثة أنظمة مختلفة، اذكر نوع النظام الذي يمثله كل شكل، مع التعليل.



الشكل	نوع النظام	التعليق
(A)	مغلق	لأنه يسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط المحيط على هيئة حرارة.
(B)	معزول	لأنه لا يسمح بتبادل أيّاً من المادة أو الطاقة مع الوسط المحيط.
(C)	مفتوح	لأنه يسمح بتبادل كل من المادة والطاقة مع الوسط المحيط.

علل : يعتبر الترمومتر الطبيعي نظام مغلق.

لأنه يسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط المحيط على هيئة حرارة.

القانون الأول للديناميكا الحرارية

٢

* عندما يفقد النظام كمية من الطاقة يكتسبها الوسط المحيط والعكس صحيح، لذلك فإن أي تغير في طاقة النظام ΔE_{system} يصاحب تغير في طاقة الوسط المحيط $\Delta E_{\text{surrounding}}$ ، حتى تظل الطاقة الكلية مقداراً ثابتاً.

$$\Delta E_{\text{system}} = -\Delta E_{\text{surrounding}}$$


* ويختص القانون الأول للديناميكا الحرارية بدراسة تغيرات الطاقة الحادثة في الأنظمة المعزولة.

القانون الأول للديناميكا الحرارية

الطاقة الكلية لأى نظام معزول تظل ثابتة، حتى لو تغير النظام من صورة لأخرى.

الحرارة (Heat) و درجة الحرارة (Temperature)

- * تعتبر الحرارة شكلًا من أشكال الطاقة، ويتوقف انتقالها من موضع (جسم) إلى آخر على الفرق في درجة الحرارة بينهما.



يزداد طاقة حركة جزيئات الماء
بنسبة كمية الحرارة التي تكتسبها

درجة الحرارة

مقياس لمتوسط طاقة حركة جزيئات المادة، يُستدل منه على حالة الجسم من حيث السخونة أو البرودة.

- * ذرات أو جزيئات المادة تكون في حالة حرقة (اهتزاز) دائمة، ولكن تتفاوت سرعتها في المادة الواحدة.

- * عند اكتساب المادة (النظام) كمية من الطاقة الحرارية، يزداد متوسط سرعة جزيئاتها وبالتالي يزداد متوسط طاقة حركة الجزيئات مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النظام والعكس صحيح.

- ماذا يحدث عند اكتساب النظام طاقة حرارية من الوسط المحيط ؟
- ما العلاقة بين درجة حرارة النظام وطاقة حركة جزيئاته ؟



أى أن العلاقة بين درجة حرارة النظام
ومتوسط طاقة حركة جزيئاته علاقة طردية.

علل : يقال متوسط سرعة جزيئات المادة ولا يقال سرعة جزيئات المادة.



لتفاوت سرعة جزيئات المادة الواحدة.

وحدات قياس كمية الحرارة

الجول

السُّعْر

الجول (J)

السُّعْر (cal)


كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة
грамм واحد (1g) من الماء النقي بمقدار $\frac{1}{4.18}$ $^{\circ}\text{C}$

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد (1g) من الماء النقي بمقدار درجة واحدة مئوية (1°C) من 15°C إلى 16°C

العلاقة بين السُّعْر والجول

$$1 \text{ J} = \frac{1}{4.18} \text{ Cal}$$

$$1 \text{ Cal} = 4.18 \text{ J}$$



تحويل وحدات قياس كمية الحرارة

الحرارة النوعية

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد (1 g) من المادة بمقدار درجة واحدة مئوية (1°C)

ما معنى قوله أن الحرارة النوعية للنحاس $0.385 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C}$ ؟

أى أن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة g 1 من النحاس بمقدار 1°C تساوى 0.385 J

* تقدر الحرارة النوعية بوحدة $\text{J/g.}^{\circ}\text{C}$

* والجدول التالي يوضح قيم الحرارة النوعية لبعض المواد :

المادة	الحرارة النوعية ($\text{J/g.}^{\circ}\text{C}$)	النحاس	الحديد	الكريون	الألومنيوم	بخار الماء	الماء السائل
4.18	0.385	0.448	0.711	0.9	2.01	4.18	


* ومنه نستنتج أن :

- الحرارة النوعية خاصية مميزة للمادة ... **علل** لأنها مقدار ثابت للمادة الواحدة، يختلف من مادة إلى أخرى.
- الحرارة النوعية للماء أكبر من الحرارة النوعية لأى مادة أخرى ... **علل** لأن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة g 1 من الماء بمقدار 1°C أكبر مما لأى مادة أخرى.
- الحرارة النوعية للمادة الواحدة تختلف باختلاف حالتها الفيزيائية.

علل : يقوم المزارعون في البلدان ذات الجو شديد البرودة برش أشجار الفاكهة بالماء

لارتفاع الحرارة النوعية للماء فيستغرق خفض درجة حرارته وقتاً طويلاً، وهو ما يحمي ثمار الأشجار من التجمد.

* المادة التي تحتاج لاكتساب كمية حرارة كبيرة لترتفع درجة حرارتها تكون حرارتها النوعية مرتفعة، ويستغرق رفع أو خفض درجة حرارة هذه المادة وقتاً طويلاً، والعكس صحيح.



ماذا يحدث عند تسخين كلتان متساويتين من النحاس (حرارته النوعية $0.385 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C}$) والألومنيوم (حرارته النوعية $0.9 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C}$) لهما نفس درجة الحرارة الابتدائية لفترة زمنية متساوية باستخدام نفس مصدر الحرارة ؟ مع التعليل.

ترتفع درجة حرارة النحاس بدرجة أكبر من الألومنيوم، لأن الحرارة النوعية للنحاس أقل من الحرارة النوعية للألومنيوم.

حساب كمية الحرارة

* العمليات التي تتضمن تغير في درجة الحرارة، قد تكون :

عمليات طاردة للحرارة



$$T_{sys} > T_{sur}$$

يُمْكِنُ النَّظَامُ طَاقَةً حَرَارِيَّةً

تنتقل فيها الحرارة من النظام إلى الوسط المحيط، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط T_{sur} وانخفاض درجة حرارة النظام T_{sys} إلى أن تتساوى درجة حرارتهما

$$(T_{sys} = T_{sur})$$

تناسب كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة تناصعاً طرورياً مع مقدار التغير في درجة الحرارة.

* يمكن حساب كمية الحرارة اللازمة لرفع أو خفض درجة حرارة النظام أو الوسط المحيط من العلاقة :

كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة
تحت ضغط ثابت p

$$q_p = m c \Delta T$$

(J) (g) (J/g.°C) (°C)

التغير في درجة الحرارة
 $\Delta T = T_2 - T_1$

كتلة المادة

$$m = \frac{q_p}{c \Delta T}$$

التغير في درجة الحرارة

$$\Delta T = \frac{q_p}{m c}$$

$$T_1 = T_2 - \Delta T$$

(درجة الحرارة الابتدائية)

$$T_2 = \Delta T + T_1$$

(درجة الحرارة النهائية)

الحرارة النوعية

$$c = \frac{q_p}{m \Delta T}$$

أكتب العلاقة الرياضية التي تربط بين كمية الحرارة الممتصة تحت ضغط ثابت و الحرارة النوعية.

عمليات ماصة للحرارة



$$T_{sur} > T_{sys}$$

يكتسب النَّظَامُ طَاقَةً حَرَارِيَّةً

تنتقل فيها الحرارة من الوسط المحيط إلى النظام، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الوسط المحيط T_{sur} وارتفاع درجة حرارة النظام T_{sys} إلى أن تتساوى درجة حرارتهما

$$(T_{sur} = T_{sys})$$

(١) احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 100 g من الماء النقى بمقدار 21.5°C

الحل :

$$q_p = ?$$

$$m = 100 \text{ g}$$

$$\Delta T = 21.5^{\circ}\text{C}$$

$$c = 4.18 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C}$$

$$q_p = mc\Delta T$$

$$= 100 \times 4.18 \times 21.5 = 8987 \text{ J}$$

(٢) احسب كمية الحرارة (بالچول و السعر) اللازمة لرفع درجة حرارة قطعة من الحديد كتلتها 1.3 g من 25°C إلى 46°C , علماً بأن الحرارة النوعية للحديد $0.448 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C}$

الحل :

$$q_p = ?$$

$$m = 1.3 \text{ g}$$

$$T_1 = 25^{\circ}\text{C}$$

$$T_2 = 46^{\circ}\text{C}$$


$$c = 0.448 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = T_2 - T_1 = 46 - 25 = 21^{\circ}\text{C}$$

$$q_p = mc\Delta T = 1.3 \times 0.448 \times 21 = 12.23 \text{ J}$$

$$q_{p(\text{cal})} = \frac{12.23}{4.18} = 2.926 \text{ cal}$$

لتحويل كمية الحرارة من وحدة الچول (J) إلى وحدة السعر (cal) يتم القسمة على 4.18



كتلة 1 L (1000 mL) من الماء تساوى 1 kg

* في المحاليل المخفقة :

• الحرارة النوعية للمحلول

الحرارة النوعية للماء ($4.18 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C}$)

• كتلة 1 mL من محلول المخفق تساوى 1 g

لأن كثافة الماء 1 g/cm^3

(٣) احسب كمية الحرارة المصاحبة لعملية ذوبان مول من نترات الأمونيوم في مقدار من الماء لعمل محلول حجمه 100 mL, علماً بأن درجة الحرارة قد انخفضت من 25°C إلى 17°C

الحل :

$$q_p = ?$$

$$m = 100 \text{ g}$$

$$T_1 = 25^{\circ}\text{C}$$

$$T_2 = 17^{\circ}\text{C}$$

$$c = 4.18 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C}$$

$$q_p = mc\Delta T$$

$$= 100 \times 4.18 \times (17 - 25) = -3344 \text{ J}$$

الإشارة السالبة لقيمة q_p تعنى أن الوسط المحيط فقد كمية من الحرارة مقدارها 3344 J وهى التي اكتسبها النظام

(٤) احسب الحرارة النوعية لمادة مجهولة كتلتها 155 g، ترتفع درجة حرارتها من 25°C إلى 40°C

عندما تمتلك كمية من الحرارة مقدارها 5700 J

الحل :

$$c = ? \quad , \quad m = 155 \text{ g} \quad , \quad T_1 = 25^\circ\text{C} \quad , \quad T_2 = 40^\circ\text{C} \quad , \quad q_p = 5700 \text{ J}$$

$$c = \frac{q_p}{m \Delta T}$$

$$= \frac{5700}{155 \times (40 - 25)}$$

$$= 2.45 \text{ J/g.}^\circ\text{C}$$

(٥) احسب قيمة الحرارة النوعية للماء بوحدة J/kg.°C

الحل :

$$\therefore C = 4.18 \text{ J/g.}^\circ\text{C}$$

$$\therefore C (\text{J/kg.}^\circ\text{C}) = 4.18 \times 1000$$

$$= 4180 \text{ J/kg.}^\circ\text{C}$$

(٦) عينة من الرمل كتلتها 6 kg ودرجة حرارتها الابتدائية 20°C اكتسبت كمية من الحرارة مقدارها 65000 J

احسب درجة الحرارة النهائية للعينة، علمًا بأن الحرارة النوعية للرمل 840 J/kg.°C

الحل :

$$m = 6 \text{ kg} \quad , \quad T_1 = 20^\circ\text{C} \quad , \quad q_p = 65000 \text{ J} \quad , \quad T_2 = ? \quad , \quad c = 840 \text{ J/kg.}^\circ\text{C}$$

$$\Delta T = \frac{q_p}{mc}$$

$$= \frac{65000}{6 \times 840} = 12.897^\circ\text{C}$$


$$T_2 = \Delta T + T_1$$

$$= 12.897 + 20 = 32.897^\circ\text{C}$$

إذا كانت الكتلة مقدرة بوحدة (kg)
والحرارة النوعية مقدرة بوحدة (J/kg.°C)
فيتمكن التعويض بهم في القانون دون تحويل

المسعر الحراري

التركيب



- إناء معزول «لمنع تبادل الطاقة و المادة مع الوسط المحيط».
- ترمومتراً.
- ساق للتقليل.
- مواد متقاعدة «تمثل النظام المعزول».
- مترôمتر.
- ساق للتقليل.

الاستخدام

* يستخدم في قياس التغيرات الحادثة في درجة حرارة التفاعلات الكيميائية بمعلومية كل من درجة الحرارة الابتدائية T_1 ، و درجة الحرارة النهائية T_2

فكرة العمل

* يعمل المسعر الحراري كنظام معزول للمواد التي يدخله ... **علل؟**
لأنه يمنع فقد أو اكتساب أيّاً من الطاقة أو المادة مع الوسط المحيط.

* وهناك عدة أنواع من المسعرات الحرارية، منها مسعر القنبلة.

مسعر القنبلة

الاستخدام

* يستخدم في قياس حرارة احتراق بعض المواد.


طريقة الاستخدام

* يتم وضع كمية معلومة من المادة المطلوب حساب حرارة احتراقها في وعاء معزول من الصلب يُعرف بوعاء الاحتراق والذى يحاط بسائل التبادل الحرارى (الماء غالباً).

* يتم حرق المادة في وفرة من غاز الأكسجين تحت الضغط الجوى المعتمد بواسطة سلك الاشتعال الكهربائى.

* تنتقل كمية من الحرارة من النظام (المادة المحترقة) إلى الوسط المحيط (الماء) فترتفع درجة حرارة الماء بمقدار الطاقة الناتجة عن عملية الاحتراق.

* يتم تعين حرارة احتراق المادة بدالة الارتفاع في درجة حرارة الماء.



ما السائل المستخدم كمادة يتم معها التبادل الحراري في مسعر القنبلة؟ ولماذا؟

الماء / لارتفاعه النوعية مما يسمح له باكتساب أو فقد كمية كبيرة من الطاقة.

المحتوى الحراري

* تخزن كل مادة قدرًا محدودًا من الطاقة، يُعرف بالطاقة الداخلية، وهو يساوي محصلة الطاقات الثلاث الآتية :

٢ الطاقة المخزنة بين الجزيئات

* تتمثل في قوى التجاذب بين جزيئات المادة حيث يوجد عدة قوى، منها :
 - قوى جذب ثاندرفال وهي عبارة عن طاقة وضع.
 - الروابط الهيدروجينية والتي تتوقف على طبيعة الجزيئات وقطبيتها.

٢ الطاقة المخزنة في الجزيء

تتمثل في طاقة الروابط الكيميائية الموجودة بين ذرات كل جزء (أو أيونات كل وحدة صيغة)، سواء كانت تلك الروابط تساهمية أو أيونية.

١ الطاقة المخزنة في الذرة

تتمثل في طاقة الإلكترونات في مستويات الطاقة، وهي محصلة طاقتي الوضع والحركة لكل إلكترون في مستوى طاقته.

* ويطلق على محصلة هذه الطاقات الثلاث في المول الواحد من المادة مصطلح المحتوى الحراري أو الإنثالبي المولاري (H).

المحتوى الحراري (الإنثالبي المولاري) H

مجموع الطاقات المخزنة في مول واحد من المادة.

: يقدر المحتوى الحراري بوحدة kJ/mol

ما معنى أن الإنثالبي المولاري لغاز NO_2 هو 33.58 kJ/mol يساوي

أى أن مجموع الطاقات المخزنة في 1 mol من غاز NO_2 يساوي 33.58 kJ

علل : يختلف المحتوى الحراري من مادة لأخرى.

لاختلاف المواد عن بعضها في عدد ونوع الذرات الداخلة في تركيب الجزيئات (أو أيونات وحدات الصيغة) ونوع الروابط الموجودة بين تلك الذرات (أو الأيونات).

- * لا يمكن عملياً قياس الإنثالبي المولاري (المحتوى الحراري) لمادة معينة، ولكن يمكن تعريف التغير في الإنثالبي المولاري (التغير في المحتوى الحراري) للتفاعل ΔH عند تحول المادة إلى مادة أخرى أثناء التفاعل الكيميائي.

التغير في المحتوى الحراري ΔH

الفرق بين مجموع المحتوى الحراري للنواتج ومجموع المحتوى الحراري للمتفاعلات.

$$\text{التغير في المحتوى الحراري} = \text{المحتوى الحراري للنواتج} - \text{المحتوى الحراري للمتفاعلات}$$

- * ويمكن كتابته على الصورة : $\Delta H = H_{\text{prod}} - H_{\text{react}}$ متقابلات، نواتج

- الظروف القياسية عند حساب ΔH°
- الضغط = 1 atm «الضغط الجوي المعتاد»
- درجة الحرارة = 25°C «درجة حرارة الغرفة»
- التركيز = 1 M «التركيز المولاري»

التغير في المحتوى الحراري
القياسي للنظام ΔH°

- * ويطلق على التغير في المحتوى الحراري لأى تفاعل يتم في الظروف القياسية مصطلح التغير في المحتوى الحراري القياسي ΔH° والذي يحدد من العلاقة :

$$\Delta H^\circ = -\frac{q_p}{n}$$


كمية الحرارة
(المنطلقة أو الممتصة)
عدد مولات المادة

- * مع مراعاة الإشارات الموضحة بالجدول التالي :

العمليات الماءحة للحرارة	العمليات الطاردة للحرارة	
$- \Delta T$	$+ \Delta T$	التغير في درجة الحرارة
$- q$ (طاقة ممتصة)	$+ q$ (طاقة منطلقة)	طاقة الحرارية المصاحبة للنظام (كمية الحرارة)
$+ \Delta H$	$- \Delta H$	مقدار التغير في المحتوى الحراري

أمثلة

- (١) احسب كمية الحرارة المنطلقة من احتراق g 5.76 من غاز الميثان CH_4 في وفرة من غاز الأكسجين $[\text{C} = 12, \text{H} = 1]$ عند ثبوت الضغط. تبعاً للتفاعل :




الحل : الكتلة المولية لمركب CH_4 $16 \text{ g/mol} = (1 \times 4) + 12$

$$0.36 \text{ mol} = \frac{5.76}{16} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية للمادة}} = \frac{\text{عدد المولات (n)}}{\text{الكتلة المولية للمادة}}$$

$$\therefore \Delta H^\circ = \frac{-q_p}{n}$$

$$\therefore q_p = -\Delta H^\circ \times n = -(-890 \times 0.36) = +320.4 \text{ kJ}$$

(٢) احسب كمية الحرارة المتصدة عند تفكك 85 g من غاز النشار، تبعاً للمعادلة التالية :



[N = 14 , H = 1]


الحل :

$$\text{الكتلة المولية لمركب } \text{NH}_3 = (1 \times 3) + 14 = 17 \text{ g/mol}$$

$$\text{عدد المولات (n)} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية للمادة}} = \frac{85}{17} \text{ mol}$$

$$\therefore \Delta H^\circ = \frac{-q_p}{n}$$

$$\therefore q_p = -\Delta H^\circ \times n = -(+46 \times 5) = -230 \text{ kJ}$$



(٣) الشكل المقابل يعبر عن عملية تسخين 500 g من الماء بالطاقة الحرارية الناتجة من احتراق زيت الزيتون، مستعيناً بالجدول التالي :

21°C	درجة حرارة الماء الابتدائية
- 41 kJ/g	لاحتراق زيت الزيتون ΔH
28 kJ	كمية الحرارة المفقودة

احسب درجة الحرارة النهائية للماء بعد الاحتراق التام لـ 2.97 g من زيت الزيتون.

الحل :

كمية الحرارة المنطلقة من احتراق 2.97 g من زيت الزيتون :

$$q_{p(\text{زيت الزيتون})} = -(\Delta H \times m)$$

$$= -(-41 \times 2.97) = 121.77 \text{ kJ}$$

إذا كانت قيمة ΔH مقدرة بوحدة (kJ/g)
فيتم التعويض في القانون بالكتلة (m)
بدلاً من عدد المولات (n)

كمية الحرارة اللازمة لتسخين 500 g من الماء = كمية الحرارة المنطلقة - كمية الحرارة المفقودة

$$q_{p(\text{ماء})} = q_{p(\text{زيت الزيتون})} - q_{p(\text{المفقودة})}$$

$$= 121.77 - 28 = 93.77 \text{ kJ} = 93770 \text{ J}$$

$$\therefore q_{p(\text{ماء})} = mc\Delta T$$

$$\Delta T = \frac{q_p}{mc} = \frac{93770}{500 \times 4.18} = 44.87^\circ\text{C}$$

$$\therefore T_2 = \Delta T + T_1 = 44.87 + 21 = 65.87^\circ\text{C}$$

التفاعلية الطاردة للحرارة و التفاعلية الماصة للحرارة

تحتفل التفاعلات الكيميائية تبعاً للتغيرات الحرارية المصاحبة لها إلى :

تفاعلات ماصة للحرارة

التفاعلات الماصة للحرارة

تفاعلات يلزم لحدوثها امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط، فتنخفض درجة حرارته.




تفاعلات ماصة للحرارة

تفاعلات طاردة للحرارة

التفاعلات الطاردة للحرارة


تفاعلات ينتج منها انطلاق طاقة حرارية، كناتج من نواتج التفاعل إلى الوسط المحيط، فترتفع درجة حرارته.



تفاعلات طاردة للحرارة


مسار الطاقة الحرارية

- * تنتقل الطاقة الحرارية من الوسط المحيط إلى النظام، مما يؤدي إلى :
- * ارتفاع درجة حرارة النظام.
- * انخفاض درجة حرارة الوسط المحيط.



تفاعل ماص للحرارة

- * تنتقل الطاقة الحرارية من النظام إلى الوسط المحيط، مما يؤدي إلى :
- * انخفاض درجة حرارة النظام.
- * ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط.



تفاعل طارد للحرارة

التغير في المحتوى الحراري القياسي (ΔH°)

* قيمة ΔH° لتفاعلات الماصة للحرارة تكون بإشارة موجة ... عل؟

لأن المحتوى الحراري (الإنتالبي) للنواتج أكبر من المحتوى الحراري للمتفاعلات.

$$\therefore H_{\text{prod}} > H_{\text{react}}$$

$$\therefore H_{\text{prod}} - H_{\text{react}} = \Delta H^\circ > 0$$





* قيمة ΔH° لتفاعلات الطاردة للحرارة تكون بإشارة سالبة ... عل؟

لأن المحتوى الحراري (الإنتالبي) للنواتج أقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات.

$$\therefore H_{\text{prod}} < H_{\text{react}}$$


$$\therefore H_{\text{prod}} - H_{\text{react}} = \Delta H^\circ < 0$$

المخطط العام للتفاعل




تطبيق





تفاعل تفكك كربونات الماغنيسيوم بالحرارة إلى أكسيد الماغنيسيوم وغاز ثاني أكسيد الكربون



تفاعل اتحاد غازى الهيدروجين والأكسجين
لتكون الماء



مخطط الطاقة للتفاعل



: عل

(٢) التفاعلات الماصة للحرارة تكون مصحوبة
بامتصاص قدر من الطاقة الحرارية.

لأن مجموع المحتوى الحراري للمواد الناتجة يكون أكبر مما للمواد المتفاعلة، وتبعاً لقانون
بقاء الطاقة لابد من تعويض النقص في حرارة
المتفاعلات في صورة طاقة ممتصة.

(١) التفاعلات الطاردة للحرارة تكون مصحوبة
بانطلاق قدر من الطاقة الحرارية.

لأن مجموع المحتوى الحراري للمواد الناتجة يكون أقل مما للمواد المتفاعلة، وتبعاً لقانون
بقاء الطاقة لابد من تعويض النقص في
حرارة النواتج في صورة طاقة منطلقة.

المعادلة الكيميائية الحرارية

المعادلة الكيميائية الحرارية

معادلة كيميائية رمزية موزونة تتضمن قيمة التغير في المحتوى الحراري (الإنثالبي المولار) المصاحب للتفاعل والذي يمثل أحياناً في المعادلة كأحد المتفاعلات أو النواتج.

* الجدول التالي يوضح الشروط الواجب مراعاتها عند كتابة المعادلة الكيميائية الحرارية :

شروط كتابة المعادلة الكيميائية الحرارية	تطبيق
① يلزم أن تكون المعادلة موزونة ، ويمكن كتابة المعاملات في صورةكسور.	$\text{H}_{2(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ $\Delta H^\circ = -285.8 \text{ kJ/mol}$
② يلزم كتابة الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج.	$\text{H}_{2(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(v)}$ $\Delta H^\circ = -242 \text{ kJ/mol}$
③ أن تكون قيمة ΔH ، مسبوقة بإشارة : • موجبة إذا كانت العملية ماصة للحرارة. • سالبة إذا كانت العملية طاردة للحرارة.	«تتغير قيمة ΔH° للماء بتغير حالته الفيزيائية»
④ عند قسمة أو ضرب معاملات طرفي المعادلة بمعامل عدد معين، تجري نفس العملية على قيمة التغير في المحتوى الحراري ΔH .	$\text{H}_2\text{O}_{(s)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ $\Delta H^\circ = +6 \text{ kJ/mol}$ * بضرب المعادلة × 2 $2\text{H}_2\text{O}_{(s)} \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ $\Delta H = 2 \times (+6) = +12 \text{ kJ}$
⑤ عند عكس العملية (اتجاه سير التفاعل)، يتم عكس إشارة ΔH° .	$\text{H}_2\text{O}_{(s)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ $\Delta H^\circ = +6 \text{ kJ/mol}$ $\text{H}_2\text{O}_{(l)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(s)}$ $\Delta H^\circ = -6 \text{ kJ/mol}$

؟ عل:

(١) عند وزن المعادلة الكيميائية الحرارية يمكن كتابة المعاملات في صورةكسور وليس بالضرورة أعداد صحيحة.

لأن المعاملات تمثل عدد مولات المتفاعلات والنواتج وليس عدد الجزيئات.

(٢) يلزم كتابة **الحالة الفيزيائية** لكل من المتفاعلات والنواتج في المعادلة الكيميائية الحرارية.

لأن المحتوى الحراري (الإنثالبي المولاري) للمادة يتغير بتغير حالتها الفيزيائية.


ما التفسير العلمي لكون قيمة ΔH° للعملية التالية بإشارة موجبة :



لأن تحول الثلج إلى ماء سائل يلزم امتصاص قدر من الطاقة الحرارية لكسر الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الثلج.


مثال

احسب مقدار التغير في الإنتالبي لعملية اتحال g 252 من كربونات الماغنيسيوم، تبعاً للتفاعل :



الحل : الكتلة المولية لمركب MgCO_3 $= (16 \times 3) + 12 + 24 = 84 \text{ g/mol}$

$$\text{عدد مولات } \text{MgCO}_3 = \frac{252}{84} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{كتلة المولية للمادة}}$$



\therefore مقدار التغير في الإنتالبي (ΔH) الناتج عن اتحال g 252 (3 mol من MgCO_3)

$$351.9 \text{ kJ} = 117.3 \times 3 =$$

طاقة الرابطة

* تخزن الروابط الكيميائية الطاقة الكيميائية في صورة طاقة وضع.

طاقة الرابطة

مقدار الطاقة اللازمة لكسر الرابطة أو المنطلقة عند تكوين الرابطة في مول واحد من المادة.

في التفاعل الكيميائي يتم

تكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات
المادة الناتجة

كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات
المادة المتفاعلة




* تكوين الروابط عملية طاردة للحرارة ... علی ؟


لأنها تكون مصحوبة بانطلاق مقدار من الطاقة إلى الوسط المحيط، وتكون قيمة ΔH° لها بإشارة سالبة.

* كسر الروابط عملية ماصة للحرارة ... علی ؟

لأنه يلزم لحدوثها امتصاص مقدار من الطاقة من الوسط المحيط، وتكون قيمة ΔH° لها بإشارة موجبة.



تكوين الروابط عملية طاردة للحرارة



كسر الروابط عملية ماصة للحرارة

* ويمثل التغير في المحتوى الحراري للتفاعل (ΔH)


المجموع الجبرى للطاقة الممتصة و المنطلقة أثناء التفاعل الكيميائى.

$\Delta H = \text{الطاقة الممتصة أثناء كسر روابط المتفاعلات} + \text{الطاقة المنطلقة أثناء تكوين روابط التوازن}$
«بإشارة سالبة»

وبناءً على ما سبق يمكن تحديد نوع التفاعل

حيث أنه في :

التفاعل الماصل للحرارة



كسر الروابط ينتهي
مقدار أقل من الطاقة

تكوين الروابط ينطلق منه
مقدار أقل من الطاقة


يكون مقدار الطاقة المنطلقة
أثناء كسر الروابط في جزيئات المتفاعلات

أكبر من

مقدار الطاقة المنطلقة

أثناء تكوين الروابط في جزيئات التوازن

التفاعل الطارد للحرارة



كسر الروابط ينطلق منه
مقدار أكبر من الطاقة

يكون مقدار الطاقة المنطلقة
أثناء تكوين الروابط في جزيئات التوازن

أكبر من

مقدار الطاقة الممتصة

أثناء كسر الروابط في جزيئات المتفاعلات

قيمة ΔH° له

بإشارة موجبة

بإشارة سالبة

؟ علل : استخدام مفهوم متوسط طاقة الرابطة بدلاً من طاقة الرابطة.

لاختلاف طاقة الرابطة الواحدة، تبعاً لنوع المركب وحالته الفيزيائية.

* والجدولان التاليان يوضحان متوسط الطاقة لبعض الروابط :


متوسط طاقة الرابطة (kJ/mol)	الرابطة	متوسط طاقة الرابطة (kJ/mol)	الرابطة
346	C – C	432	H – H
610	C = C	467	H – O
835	C ≡ C	413	H – C
358	C – O	389	H – N
803	C = O	498	O = O

؟ ما معنى قولنا أن متوسط طاقة الرابطة (C – C) يساوى 346 kJ/mol ؟

أى أن مقدار الطاقة الممتصة عند كسر هذه الرابطة أو المنطلقة عند تكوينها فى 1 mol من المادة فى الظروف القياسية تساوى 346 kJ

أمثلة

(١) احسب ΔH للتفاعل التالي، مع بيان نوع التفاعل (طارد أم ماص للحرارة).




مستعيناً بقيم متوسط طاقة الروابط الموضحة بالجدول المقابل

الحل :

متوسط طاقة الرابطة (kJ/mol)	الرابطة
413	C – H
498	O = O
803	C = O
467	O – H

للايضاح فقط



* الطاقة الممتصة أثناء كسر روابط المتفاعلات $= [4(\text{C} - \text{H}) + 2(\text{O} = \text{O})] = [(4 \times 413) + (2 \times 498)] = +2648 \text{ kJ}$

* الطاقة المنطلقة أثناء تكوين روابط النواتج $= [2(\text{C} = \text{O}) + 2 \times 2(\text{O} - \text{H})] = [(2 \times 803) + (4 \times 467)] = -3474 \text{ kJ}$

$\Delta H = \text{طاقة الممتصة أثناء كسر روابط المتفاعلات} + \text{طاقة المنطلقة أثناء تكوين روابط النواتج}$


$\therefore \Delta H = (+2648) + (-3474) = -826 \text{ kJ}$

$\therefore \Delta H$ بإشارة سالبة.



متوسط طاقة الرابطة (kJ/mol)	الرابطة
946	$\text{N} \equiv \text{N}$
432	$\text{H} - \text{H}$
163	$\text{N} - \text{N}$
389	$\text{N} - \text{H}$

(٢) احسب ΔH للتفاعل :



مستعيناً بقيم متوسط طاقة الروابط الموضحة بالجدول المقابل، ثم حدد نوع التفاعل (طارد للحرارة أم ماص للحرارة)، مع بيان السبب.

الحل :

* الطاقة الممتصة أثناء كسر روابط المتفاعلات

$$= [(\text{N} \equiv \text{N}) + 2(\text{H} - \text{H})] = [946 + (2 \times 432)] = +1810 \text{ kJ}$$

* الطاقة المنطلقة أثناء تكوين روابط النواتج

$$= [4(\text{N} - \text{H}) + (\text{N} - \text{N})] = [(4 \times 389) + (-163)] = -1719 \text{ kJ}$$


ΔH = الطاقة الممتصة أثناء كسر روابط المتفاعلات + الطاقة المنطلقة أثناء تكوين روابط النواتج

$$\Delta H = (+1810) + (-1719) = +91 \text{ kJ}$$

∴ قيمة ΔH بإشارة موجبة.


لأن مقدار الطاقة الممتصة أثناء كسر الروابط في جزيئات المتفاعلات < مقدار الطاقة المنطلقة أثناء تكوين الروابط في جزيئات النواتج.

(٣) احسب متوسط طاقة الرابطة لغاز الأكسجين من المعادلة التالية :



$(\text{O} - \text{H}) = 467 \text{ kJ/mol}$ ، $(\text{H} - \text{H}) = 432 \text{ kJ/mol}$ علماً بأن :

الحل :



* الطاقة الممتصة أثناء كسر روابط المتفاعلات

$$= [2 \times 2(\text{O} - \text{H})] = 4 \times 467 = +1868 \text{ kJ}$$

ΔH = الطاقة الممتصة أثناء كسر روابط المتفاعلات + الطاقة المنطلقة أثناء تكوين روابط النواتج

$$\Delta H = (+1868) + [2(\text{H} - \text{H}) + (\text{O} = \text{O})]$$

$$+506 = (+1868) - [2(432) - (498)]$$

$$+506 = (+1868) - [(2 \times 432) - (498)]$$

$$\therefore (\text{O} = \text{O}) = +1868 - 864 - 506 = 498 \text{ kJ/mol}$$

الوحدة 2

صور التغير في المحتوى الحراري

- الدرس الأول** من التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية و الكيميائية.
إلى ما قبل التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية.
- الدرس الثاني** من التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية.
إلى نهاية الفصل.

نواتج التعلم

أهم المفاهيم

- حرارة الذوبان القياسية.
- حرارة الذوبان المولارية.
- الإماهة.
- حرارة التخفيف القياسية.
- حرارة الاحتراق.
- حرارة الاحتراق القياسية.
- حرارة التكوين.
- حرارة التكوين القياسية.
- قانون هس.

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :

- (١) يفسر مصدر حرارة الذوبان ويستنتج ماهية حرارة الذوبان المولارية.
- (٢) يحسب حرارة الذوبان و حرارة الذوبان المولارية.
- (٣) يقارن بين الذوبان الطارد للحرارة و الذوبان الماصل للحرارة.
- (٤) يستنتج ماهية حرارة التخفيف القياسية.
- (٥) يستنتج ماهية حرارة الاحتراق و حرارة التكوين.
- (٦) يعدد بعض الأمثلة لحرارة الاحتراق.
- (٧) يحسب حرارة الاحتراق القياسية و حرارة التكوين القياسية.
- (٨) يستنتج العلاقة بين ثبات المركبات و حرارة التكويين.
- (٩) يستربط نص قانون هس و أهميته.
- (١٠) يستخدم قانون هس في حساب التغير في المحتوى الحراري لبعض التفاعلات.

أهم العناصر

* التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية :


- حرارة الذوبان القياسية.
- حرارة التخفيف القياسية.

* التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية :

- حرارة الاحتراق القياسية.
- حرارة التكوين القياسية.

* العلاقة بين حرارة التكويين و ثبات المركبات.

* قانون هس.



من

إلى

التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية و الكيميائية

ما قبل التغيرات الحرارية المصاحبة لتفاعلات الكيميائية

التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية و الكيميائية

* حساب التغير في المحتوى الحراري من الأمور الهامة، لعمليات :

- احتراق أنواع الوقود المختلفة، حيث يساهم عند تصميم المحركات في تحديد نوع الوقود الملائم لها.
- احتراق أنواع المواد المختلفة، حيث يساعد رجال الإطفاء في تحديد أنساب الطرق لمكافحة الحرائق.
- * تعدد صور التغير في المحتوى الحراري تبعاً لنوع التغير الحادث، سواء كان :
 - تغيراً كيميائياً.
 - تغيراً فيزيائياً.

التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية

* من صور التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية :

٢ حرارة التخفيف القياسية

١ حرارة الذوبان القياسية

حرارة الذوبان القياسية ΔH_{sol}°

١

* يصاحب عملية ذوبان مادة صلبة في سائل ارتفاع أو انخفاض في درجة حرارة محلول الناتج.

فعند إذابة

نترات الأمونيوم NH_4NO_3 في الماء
تنخفض درجة حرارة محلول الناتج



هيدروكسيد الصوديوم NaOH في الماء
ترتفع درجة حرارة محلول الناتج

ويسمى الذوبان في هذه الحالة



بالذوبان الماuchi للحرارة
وتكون قيمة حرارة الذوبان ΔH_{sol}° له
بإشارة موجة

بالذوبان الطارد للحرارة
وتكون قيمة حرارة الذوبان ΔH_{sol}° له
بإشارة سالية

ويُعبر عنه بالمعادلة



ويُعبر عنه بمخطط الطاقة



حرارة الذوبان

كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة عند إذابة المذاب في كمية من المذيب للحصول على محلول مشبع.

* وإذا تم الذوبان في الظروف القياسية تعرف بحرارة الذوبان القياسية ΔH_{sol}°

حرارة الذوبان القياسية

كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة عند إذابة مول من المذاب في كمية من المذيب للحصول على محلول مشبع في الظروف القياسية.

* ويمكن حساب كمية الحرارة (المنطلقة أو الممتصة) المصاحبة لعملية الذوبان من العلاقة :

$$q_p = m \cdot c \cdot \Delta T$$

(J) (g) (J/g. $^{\circ}$ C) ($^{\circ}$ C)

كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة تحت ضغط ثابت P	كتلة محلول	حرارة النوعية للمذيب	التغير في درجة حرارة محلول $\Delta T = T_2 - T_1$
--	------------	-------------------------	--

* وإذا كان حجم محلول الناتج عن ذوبان 1 مول من المذاب لترًا، فإن تركيز محلول يصبح 1 مولر (1 mol/L) وتسمي كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة في هذه الحالة بحرارة الذوبان المolarية.

حرارة الذوبان المolarية

مقدار التغير الحراري الناتج عن ذوبان مول من المذاب في كمية من المذيب لتكون 1 لتر من محلول.

* وإذا كانت كمية المادة المذابة لا تساوى 1 mol يمكن حساب حرارة الذوبان المolarية من العلاقة :

$$\Delta H_{sol} = \frac{-q_p}{n}$$

حرارة الذوبان المolarية	كمية الحرارة (المنطلقة أو الممتصة) المصاحبة لذوبان	عدد مولات المادة المذابة
-------------------------	--	--------------------------

ما معنى قولنا أن :

(١) حرارة الذوبان القياسية لبروميد الليثيوم
(٢) حرارة الذوبان المolarية لبروميد الليثيوم
+84.4 kJ/mol -49 kJ/mol

أى أن

كمية الحرارة الممتصة عند ذوبان 1 mol من بروميد الليثيوم في كمية من المذيب لتكون 1 L من محلول تساوى 84.4 kJ

كمية الحرارة المنطلقة عند ذوبان 1 mol من بروميد الليثيوم في كمية من المذيب للحصول على محلول مشبع منه في الظروف القياسية تساوى 49 kJ

أمثلة

(١) عند إذابة 80 g من NaOH في كمية من الماء لتكوين لتر من محلول، ارتفعت درجة الحرارة من 20°C إلى 44.4°C احسب :

(ب) حرارة الذوبان المolarية.

$$[Na = 23, O = 16, H = 1]$$

(ج) هل هذا الذوبان طارد أم ماصل للحرارة ؟ مع التفسير.

الحل :

$$m_{(NaOH)} = 80 \text{ g} , c = 4.18 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C} , m_{(\text{المحلول})} = 1000 \text{ g} , T_1 = 20^{\circ}\text{C} , T_2 = 44.4^{\circ}\text{C} \quad (1)$$

$$q_p = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$= 1000 \times 4.18 \times (44.4 - 20) = +101992 \text{ J} = +101.992 \text{ kJ}$$

(ب) الكتلة المolarية لمركب NaOH

$$40 \text{ g/mol} = 1 + 16 + 23 = \text{NaOH}$$

$$2 \text{ mol} = \frac{80}{40} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المolarية للمادة}}$$

$$\Delta H_{\text{sol}} = \frac{-q_p}{n} = \frac{-101.992}{2} = -51 \text{ kJ/mol}$$

(ج) الذوبان طارد للحرارة / لأن قيمة ΔH_{sol} له بإشارة سالبة.

(٢) عند إذابة 80 g من نترات الأمونيوم في كمية من الماء لتكوين لتر من محلول كانت درجة الحرارة الابتدائية 20°C والنهائية 14°C :

(أ) احسب التغير في المحتوى الحراري لعملية الذوبان.

(ب) هل يعبر التغير الحراري لهذا الذوبان عن حرارة الذوبان المolarية ؟ مع التفسير.

$$[N = 14, O = 16, H = 1]$$

(ج) هل هذا الذوبان طارد أم ماصل للحرارة ؟ مع التفسير.

الحل :

$$m_{(NH_4NO_3)} = 80 \text{ g} , c = 4.18 \text{ J/g.}^{\circ}\text{C} , m_{(\text{المحلول})} = 1000 \text{ g} , T_1 = 20^{\circ}\text{C} , T_2 = 14^{\circ}\text{C} \quad (1)$$

$$q_p = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$= 1000 \times 4.18 \times (14 - 20) = -25080 \text{ J} = -25.08 \text{ kJ}$$

(أ) الكتلة المolarية لمركب NH_4NO_3

$$80 \text{ g/mol} = (16 \times 3) + 14 + (1 \times 4) + 14 = NH_4NO_3$$

$$1 \text{ mol} = \frac{80}{80} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المolarية للمادة}}$$

$$\Delta H_{\text{sol}} = \frac{-q_p}{n} = \frac{-(-25.08)}{1} = +25.08 \text{ kJ}$$

(ب) نعم يعبر التغير الحراري لهذا الذوبان عن حرارة الذوبان المolarية /

لأن : * عدد مولات المادة المذابة (نترات الأمونيوم) = 1 mol

* حجم محلول الناتج = 1 L

(ج) الذوبان ماصل للحرارة / لأن قيمة ΔH_{sol} له بإشارة موجبة.

تفسير مصدر حرارة الذوبان


الذوبان

* تتأثر عملية الذوبان بثلاث قوى، هي:

- قوى التجاذب بين جزيئات المذاب وبعضها.
- قوى التجاذب بين جزيئات المذيب وبعضها.
- قوى التجاذب بين جزيئات المذيب والمذاب.

ولهذا تتم عملية الذوبان على ثلاثة خطوات، كما يتضح فيما يلى :


③ ارتباط جزيئات المذيب بالمذاب (عملية الإذابة)



عملية طاردة للحرارة ... **علل؟**
لانطلاق طاقة
عند ارتباط جزيئات المذيب
بجزيئات المذاب

(ΔH_3)
(بإشاره سالبة)


② فصل جزيئات المذاب عن بعضها



عملية ماصة للحرارة ... **علل؟**
لامتصاص قدر من الطاقة
لتغلب على قوى التجاذب بين
جزيئات المذاب وبعضها

(ΔH_2)
(بإشاره موجبة)

① فصل جزيئات المذيب عن بعضها



عملية ماصة للحرارة ... **علل؟**
لامتصاص قدر من الطاقة
لتغلب على قوى التجاذب بين
جزيئات المذيب وبعضها

(ΔH_1)
(بإشاره موجبة)

ويرمز للتغير في المحتوى الحراري لهذه العملية بالرمز

* ويعرف المجموع الجرى للطاقات الثلاث باسم حرارة ذوبان المحلول (ΔH_{sol})

$$\Delta H_{sol} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

- وإذا كان المذيب المستخدم هو الماء، فإن :
- كمية الحرارة المنطلقة عن عملية الإذابة تُعرف بطاقة الإماءة.

ارتباط أيونات أو جزيئات المذاب المفككة بجزيئات الماء.

ما معنى قوله أن طاقة إماءة أيونات الفضة تساوى -510 kJ/mol ؟

أى أن كمية الحرارة المنطلقة عند ارتباط مول من أيونات الفضة بجزيئات الماء تساوى 510 kJ

* ويتحدد نوع الذوبان من إشارة قيمة حرارة الذوبان (ΔH_{sol}) المصاحبة له :

فإذا كانت

$$(\Delta H_1 + \Delta H_2) > \Delta H_3$$

تكون

$$\Delta H_{\text{sol}} > 0$$

«بإشارة موجبة»

$$(\Delta H_1 + \Delta H_2) < \Delta H_3$$


$$\Delta H_{\text{sol}} < 0$$

«بإشارة سالبة»


فإن الذوبان يكون

ماص للحرارة

طارد للحرارة



مخطط ذوبان ماص للحرارة



مخطط ذوبان طارد للحرارة

قارن بين الذوبان طارد للحرارة والذوبان ماص للحرارة.

مثال

إذا أذيب 1 mol من البوتاسيوم الكاويه في الماء وكانت طاقة فصل جزيئات المذيب عن بعضها 50 kJ وطاقة تفكك جزيئات المذاب عن بعضها 100 kJ وطاقة الإماهه 400 kJ احسب حرارة ذوبان البوتاسيوم الكاويه في الماء،
موضحاً نوع الذوبان طارد أم ماص للحرارة، مع بيان السبب.

الحل:

$$\Delta H_1 = 50 \text{ kJ}, \quad \Delta H_2 = 100 \text{ kJ}, \quad \Delta H_3 = -400 \text{ kJ}$$

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{sol}} &= \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 \\ &= 50 + 100 + (-400) = -250 \text{ kJ} \end{aligned}$$

∴ الذوبان طارد للحرارة / لأن قيمة ΔH_{sol} له بأشارة سالبة.

٢ حرارة التخفيف القياسية $\Delta H_{\text{dil}}^{\circ}$

* تعرف كمية الحرارة المنطلقة أو المتصنة نتيجة زيادة كمية المذيب (التخفيف) باسم حرارة التخفيف القياسية $\Delta H_{\text{dil}}^{\circ}$

حرارة التخفيف القياسية $\Delta H_{\text{dil}}^{\circ}$



كمية الحرارة المنطلقة أو المتصنة لكل مول من المذاب عند تخفيف محلول من تركيز أعلى إلى تركيز أقل وهو في الظروف القياسية.

ما معنى قولنا أن حرارة التخفيف القياسية لمحلول هيدروكسيد الصوديوم -4.5 kJ/mol ؟

أى أن كمية الحرارة المنطلقة لكل 1 mol من هيدروكسيد الصوديوم عند تخفيف محلول من تركيز أعلى إلى تركيز أقل في الظروف القياسية تساوى 4.5 kJ

تطبيق

* عند إذابة 1 mol من هيدروكسيد الصوديوم $\text{NaOH}_{(s)}$ في كميات مختلفة من الماء $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ فإن حرارة الذوبان تختلف باختلاف كمية الماء (المذيب)، كما يتضح من المعادلتين التاليتين :



* ويلاحظ في هذا المثال أن $\Delta H_1 < \Delta H_2$

* نستنتج مما سبق أنه بزيادة كمية المذيب تزداد كمية الحرارة المنطلقة أو المتصنة.



* تتم عملية التخفيف على خطوتين متعاكستين في الطاقة، هما :

① عملية إبعاد أيونات أو جزيئات المذاب عن بعضها في محلول الأعلى تركيزاً تحتاج إلى امتصاص طاقة (عملية ماصة للحرارة).

② عملية ارتباط أيونات أو جزيئات المذاب بعدد أكبر من جزيئات المذيب ينبع عنها انطلاق طاقة (عملية طاردة للحرارة).

* ويمثل المجموع الجبوري لطاقة الإبعاد والارتباط بقيمة حرارة التخفيف.

علل : يصاحب عملية التخفيف في بدايتها امتصاص طاقة.

لأن زيادة جزيئات الماء أثناء عملية التخفيف تعمل على إبعاد أيونات أو جزيئات المذاب عن بعضها في محلول الأعلى تركيزاً مما يحتاج امتصاصاً قدرًا من الطاقة.

احرص على اقتناء

كتاب الامتحان

في

جميع المواد

للصف الأول الثانوي

كتب الامتحان لا يخرج عنها أي امتحان



التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية

* هناك عدة صور للتغيرات الحرارية المصاحبة لتفاعلات الكيميائية، منها :

حرارة التكوين القياسية.

حرارة الاحتراق القياسية.

حرارة الاحتراق القياسية ΔH_c°

الاحتراق

عملية اتحاد سريع للمادة مع الأكسجين.

ملاحظة

تفاعل الاحتراق طارد للحرارة،

وبالتالي فإن قيمة ΔH_c°

دائماً بإشارة سالبة.

* ينتج عن الاحتراق التام للعناصر أو المركبات انطلاق طاقة في صورة حرارة أو ضوء أو كلاهما،

وتعُرف كمية الحرارة المنطلقة بحرارة الاحتراق ΔH_c°

حرارة الاحتراق ΔH_c°

كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق المادة احتراقاً تاماً في وفرة من الأكسجين.

* وإذا تم الاحتراق في الظروف القياسية فإن كمية الحرارة المنطلقة تُعرف بحرارة الاحتراق القياسية ΔH_c°

حرارة الاحتراق القياسية ΔH_c°

كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق مول واحد من المادة احتراقاً تاماً في وفرة من الأكسجين في الظروف القياسية.

* ينتج عن احتراق معظم المواد العضوية (كالوقود والجلوكوز) :

• طاقة حرارية.

• ثاني أكسيد الكربون (CO_2).

• ماء (H_2O).

ما معنى قولنا أن حرارة الاحتراق القياسية للجلوكوز -2808 kJ/mol ؟

أى أن كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق 1 mol من الجلوکوز احتراقاً تاماً في وفرة من الأكسجين في الظروف القياسية تساوى 2808 kJ


أمثلة على تفاعلات الاحتراق

(١) تفاعل احتراق غاز البوتاجاز


* غاز البوتاجاز عبارة عن خليط من غازى :

• البروپان C_3H_8 • البيوتان C_4H_{10}

* وينتج عن احتراق غاز البروپان في وفرة من غاز الأكسجين كمية كبيرة من الحرارة تستخدم في طهي الطعام وغيرها من الاستخدامات.




التركيب الجزيئي
للبنيتان $C_{10}H_{22}$



التركيب الجزيئي
للبروپان C_3H_8

* المعادلة التالية والمخطط المقابل يوضحان

تفاعل احتراق غاز البروبان :




$$\Delta H_c^\circ = -2323.7 \text{ kJ/mol}$$

مخطط تفاعل احتراق غاز البروبان

(٢) تفاعل احتراق الجلوكوز داخل جسم الكائن الحي

* يعتبر احتراق الجلوكوز داخل جسم الكائن الحي من تفاعلات الاحتراق الهامة ... **على** *

لأن الحرارة الناتجة عنه تمد الكائن الحي بالطاقة اللازمة ل القيام بالعمليات الحيوية المختلفة.



اكتب المعادلة الكيميائية الحرارية المعبّرة عن :

• احتراق غاز البروبان (C_3H_8) والذي يكون مصحوب بانطلاق طاقة مقدارها 2323.7 kJ

• احتراق 1 mol من الجلوكوز ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) والذي يكون مصحوب بانطلاق طاقة مقدارها 2808 kJ


أمثلة

(١) إذا كانت حرارة احتراق 1 mol من الإيثanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) في الظروف القياسية :-1367 kJ/mol

(أ) اكتب المعادلة الحرارية المعبّرة عن ذلك.

(ب) احسب كمية الحرارة الناتجة عن احتراق 100 g من الإيثanol احتراًقاً تاماً. [C = 12, O = 16, H = 1]

الحل :



(ب) الكتلة المولية لمركب الإيثanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ = $2 \times 12 + 5 + 1 = 46 \text{ g/mol}$


$$\text{عدد مولات} = \frac{100}{46} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{كتلة المولية للمادة}} = \text{كتلة المولية للمادة}$$

$$\therefore \Delta H_c^\circ = \frac{-q_p}{n} \\ \therefore q_p = -(\Delta H_c^\circ \times n) = -(-1367 \times 2.17) = +2966.39 \text{ kJ}$$

(٢) احسب حرارة الاحتراق القياسية للبروبان C_3H_8 ، علمًا بأن التغير في المحتوى الحراري المصاحب

لاحتراق 8 g منه في كمية وفيرة من الأكسجين تساوي -422.49 kJ

[C = 12, H = 1]



$$(12 \times 3) + (1 \times 8) = 44 \text{ g/mol} \quad ? \text{ kJ/mol}$$

$$\therefore \Delta H_c^\circ = \frac{-422.49 \times 44}{8} = -2323.7 \text{ kJ/mol}$$

حرارة التكوين القياسية ΔH°

٤

- * ينبع عن تكوين المركب من عناصره الأولية انطلاق أو امتصاص قدر من الطاقة يساوى المحتوى الحراري له
يُعرف بحرارة التكوين ΔH°

حرارة التكوين ΔH°

كمية الحرارة المنطلقة أو المنتصبة عند تكوين المركب من عناصره الأولية.

- * وإذا كانت العناصر المكونة للمركب في حالتها القياسية والتي تمثل أكثر حالات المادة استقراراً في الظروف القياسية، فإن التغير الحراري المصاحب لتكوين المركب يُعرف بحرارة التكوين القياسية ΔH°

حرارة التكوين القياسية ΔH°


كمية الحرارة المنطلقة أو المنتصبة عند تكوين مول واحد من المركب من عناصره الأولية بشرط أن تكون في حالتها القياسية.

علل : الجرافيت هو الحالة القياسية للكربون.

لأنه يمثل أكثر حالات الكربون استقراراً في الظروف القياسية.

- * مع افتراض أن حرارة التكوين القياسية لجزء أي عنصر تساوى صفر.

◀ تطبيق حرارة التكوين القياسية لسكر الجلوكوز.



ما معنى قولنا أن ΔH° للجلوكوز تساوى -1260 kJ/mol ؟


أى أن كمية الحرارة المنطلقة عند تكوين 1 mol من الجلوكوز من عناصره الأولية وهى فى حالتها القياسية تساوى 1260 kJ

حساب التغير في المحتوى الحراري (التغير في الإنثالبي) ΔH للتفاعلات بدلالة حرارة التكوين القياسية

.. التغير في المحتوى الحراري = المحتوى الحراري للتواتج - المحتوى الحراري للمتفاعلات

.. المحتوى الحراري للمركبات يتساوى مع حرارة تكوينها

.. $\Delta H = \text{المجموع الجبى لحرارة تكوين التواتج} - \text{المجموع الجبى لحرارة تكوين المتفاعلات}$




* فإذا كان التفاعل :

$$\Delta H = [\Delta H_f^\circ(C) + \Delta H_f^\circ(D)] - [\Delta H_f^\circ(A) + \Delta H_f^\circ(B)] \quad \text{فإن :}$$

أمثلة

حرارة التكوين القياسية ΔH_f° (kJ/mol)	المركب
-21	$H_2S_{(g)}$
-273	$HF_{(g)}$
-1220	$SF_{6(g)}$


(١) احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل التالي :

بمعلومة حرارة التكوين القياسية للمركبات الموضحة
بالجدول المقابل :

الحل :

$$\begin{aligned}\Delta H &= [2\Delta H_f^\circ(HF) + \Delta H_f^\circ(SF_6)] - [\Delta H_f^\circ(H_2S) + 4\Delta H_f^\circ(F_2)] \\ &= [(2 \times -273) + (-1220)] - [-21 + (4 \times 0)] \\ &= (-1766) - (-21) = -1745 \text{ kJ}\end{aligned}$$

(٢) احسب حرارة التكوين القياسية لغاز النشار من التفاعل التالي :



الحل :


$$\begin{aligned}\Delta H &= [2\Delta H_f^\circ(NH_3)] - [\Delta H_f^\circ(N_2) + 3\Delta H_f^\circ(H_2)] \\ -92.4 &= 2\Delta H_f^\circ(NH_3) - [0 + (3 \times 0)] \\ \therefore \Delta H_f^\circ(NH_3) &= \frac{-92.4}{2} = -46.2 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

ملحوظة

* يتساوى التغير في المحتوى الحراري ΔH مع حرارة الاحتراق $\Delta H_f^\circ_c$ عند احتراق 1 mol من المادة في الظروف القياسية.

حرارة التكوين القياسية ΔH_f° (kJ/mol)	المركب
-74.6	$CH_{4(g)}$
-393.5	$CO_{2(g)}$
-285.85	$H_2O_{(l)}$

(٣) احسب التغير في الإنتالبي القياسي لاحتراق

الميثان $\Delta H_f^\circ_c$ تبعاً للتفاعل التالي :بمعلومة حرارة التكوين القياسية للمركبات الموضحة
بالجدول المقابل :

الحل :

التغير في المحتوى الحراري (ΔH) = المجموع الجبri لحرارة تكوين النواتج - المجموع الجبri لحرارة تكوين المتفاعلات


$$\begin{aligned}\Delta H_f^\circ_c &= [\Delta H_f^\circ(CO_2) + 2\Delta H_f^\circ(H_2O)] - [\Delta H_f^\circ(CH_4) + 2\Delta H_f^\circ(O_2)] \\ &= [(-393.5) + (2 \times -285.85)] - [(-74.6) + (2 \times 0)] \\ &= (-965.2) - (-74.6) = -890.6 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

ملاحظات

* حرارة احتراق الهيدروجين $\Delta H_{f(H_2O)}^\circ = \text{حرارة تكوين الماء}$

* حرارة احتراق الكربون $\Delta H_{f(CO_2)}^\circ = \text{حرارة تكوين ثاني أكسيد الكربون}$

(٤) المعادلة الآتية تعبّر عن عملية تكوين غاز البيوتان من عناصره الأولية :




احسب قيمة ΔH_c° لـ **البيوتان**، بمعلومية حرارة الاحتراق القياسية ΔH_c°

للمواد الموضحة بالجدول المقابل :

الحل :

حرارة الاحتراق القياسية ΔH_c° (kJ/mol)	المواد
-393.5	$C_{(s)}$
-285.85	$H_{2(g)}$
-2877	$C_4H_{10(g)}$



$$\therefore \Delta H_{f(CO_2)}^\circ = \Delta H_{c(C)}^\circ = -393.5 \text{ kJ/mol}$$

$$\therefore \Delta H_{f(H_2O)}^\circ = \Delta H_{c(H_2)}^\circ = -285.85 \text{ kJ/mol}$$

$$\therefore \Delta H_c^\circ = [4\Delta H_{f(CO_2)}^\circ + 5\Delta H_{f(H_2O)}^\circ] - [\Delta H_{f(C_4H_{10})}^\circ + \frac{13}{2}\Delta H_{f(O_2)}^\circ]$$

$$-2877 = [(4 \times -393.5) + (5 \times -285.85)] - [\Delta H_{f(C_4H_{10})}^\circ + (\frac{13}{2} \times 0)]$$

$$-2877 = -3003.25 - \Delta H_{f(C_4H_{10})}^\circ$$

$$\therefore \Delta H_{f(C_4H_{10})}^\circ = (-3003.25) - (-2877) = -126.25 \text{ kJ/mol}$$

احرص على اقتباع

الامتحان

جميع المواد

الصف الأول الثانوي



العلاقة بين حرارة التكوين وثبات المركبات

* تختلف درجة ثبات المركبات حراريًا بحسب اختلاف قيمة حرارة تكوينها، كما يتضح فيما يلى :

المركبات غير الثابتة حراريًا

مركبات غير مستقرة تميل للانحلال التلقائي إلى عناصرها الأولية في درجة حرارة الغرفة

قيمة حرارة التكوين القياسية لها ΔH_f°

تكون بإشارة موجبة ... عل؟

المركبات الثابتة حراريًا

مركبات مستقرة يصعب انحلالها إلى عناصرها الأولية في درجة حرارة الغرفة

تكون بإشارة سالبة ... عل؟


لأن

المحتوى الحراري لها يكون أكبر من

المحتوى الحراري لعناصرها الأولية

المحتوى الحراري لها يكون أقل من

المحتوى الحراري لعناصرها الأولية



ما معنى قولنا أن :

(٢) تكوين مول من مركب HI في الظروف القياسية يكون مصحوبًا بامتصاص طاقة مقدارها 26 kJ ؟

أى أن

حرارة التكوين القياسية (ΔH_f°) لمركب HI تساوى 26 kJ/mol وهو مركب غير ثابت حراريًا

(١) تكوين مول من مركب HBr في الظروف القياسية يكون مصحوبًا بانطلاق طاقة مقدارها 36 kJ ؟

حرارة التكوين القياسية (ΔH_f°) لمركب HBr تساوى -36 kJ/mol وهو مركب ثابت حراريًا

؟
وضح العلاقة بين حرارة التكوين القياسية للمركب و درجة ثباته حرارياً،
لهم اذكر ملقة ذلك باتجاه سير التفاعلات الكيميائية.

- * كلما قلت حرارة التكوين القياسية للمركب كلما ازداد ثباته الحراري والعكس صحيح.
- * تميل معظم التفاعلات للسير في اتجاه تكوين المركبات الأقل في قيمة حرارة التكوين (الأكثر ثباتاً).

؟
عمل : ارتباط ثبات المركبات بحرارة تكوينها.

أمثلة


ΔH_f° (kJ/mol)	المركب
-36	HBr _(g)
+26	HI _(g)
-271	HF _(g)
-92	HCl _(g)

(1) رتب المركبات الموضحة بالجدول المقابل
تصاعدياً حسب درجة ثباتها الحراري.


فكرة الحل :

كلما قلت قيمة حرارة تكوين المركب،
كلما زادت درجة ثباته الحراري.

الحل :



(2) أيّاً من المعادلتين الآتتين تعبر عن التفاعل الذي يحدث بالفعل ؟ مع بيان السبب.



علمًا بأنّ حرارة تكوين غاز SO_2 تساوى 296.83 kJ/mol و غاز SO_3 تساوى -395.72 kJ/mol

الحل :

المعادلة (1) تعبر عن التفاعل الذي يحدث بالفعل / لأن التفاعل يسير في اتجاه تكوين المركب الأكثر ثباتاً «الأقل في قيمة حرارة التكوين».

قانون هس



علل؟

* يلجأ العلماء إلى استخدام طرق غير مباشرة لحساب حرارة التفاعل ...

لعدة أسباب، منها :

(١) اختلاط المواد المتفاعلة أو الناتجة بمواد أخرى.

(٢) البطل الشديد لبعض التفاعلات كتفاعل صدأ الحديد الذي يستغرق وقتاً طويلاً.

(٣) خطورة قياس حرارة التفاعل بطريقة تجريبية.

(٤) صعوبة قياس حرارة التفاعل في الظروف العادية من الضغط ودرجة الحرارة.

يصعب قياس حرارة تفاعل
صدأ الحديد بطريقة مباشرة

* ومن الطرق التي استخدمها العلماء لحساب حرارة التفاعلات التي يصعب

قياس ΔH° لها بطريقة مباشرة، قانون المجموع الجبرى الثابت للحرارة

المعروف بقانون هس.

قانون هس

حرارة التفاعل مقدار ثابت في الظروف القياسية، سواء تم التفاعل على خطوة واحدة أو على عدة خطوات.

* ويتعامل قانون هس مع المعادلات الكيميائية الحرارية، وكأنها معادلات جبرية يمكن جمعها أو طرحها
أو ضرب معاملاتها في معاملات ثابتة.



علل : يعتبر قانون هس أحد صور القانون الأول للدينамиكا الحرارية.

لأنه يعتبر التفاعل الكيميائي نظام معزول تكون حرارته مقدار ثابت.



* ويعبر عن قانون هس بالصيغة الرياضية المقابلة :

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \dots$$


تطبيق حساب المحتوى الحراري لتفاعل يتم على خطوتين :



* بجمع المعادلتين وحذف المواد التي لم يحدث لها تغيير أثناء التفاعل





أمثلة





(١) احسب حرارة تكوين غاز أول أكسيد الكربون تبعاً للمعادلة :

بمعلومة المعادلتين الحراريتين التاليتين :





الحل :

بطرح المعادلة (٢) من المعادلة (١) :




وبنقل $\text{CO}_{(\text{g})}$ من الطرف الأيسر للمعادلة إلى الطرف الأيمن للمعادلة (بإشارة مخالفة) :(٢) احسب حرارة احتراق غاز أكسيد النيتروجين NO تبعاً للمعادلة :

بمعلومة المعادلتين الحراريتين التاليتين :



الحل :

بطرح المعادلة (١) من المعادلة (٢) :

وبنقل $\text{NO}_{(\text{g})}$ من الطرف الأيمن للمعادلة إلى الطرف الأيسر للمعادلة (بإشارة مخالفة) :

علل : يستحيل عملياً أن نقيس بدقة كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق الكربون لتكوين غاز أول أكسيد الكربون.

لأن عملية أكسدة الكربون لا يمكن أن تتوقف عند مرحلة تكوين أول أكسيد الكربون، بل تستمر مكونة غاز ثانى أكسيد الكربون.

نحوذج بوكليت على الباب الرابع


بنطاق
Open Book

دورة ٢٠

مجاب
عنه

١٠ = ١ × ١٠

١٦ : اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة من




أياً من الاختيارات الآتية تُعبر عن التفاعل الذي ينتج أكبر قدر من الحرارة ؟

| ال اختيار |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| R | J | G | B | A |
| ضعيفة | ضعيفة | قوية | قوية | الروابط في R_2 |
| ضعيفة | ضعيفة | قوية | قوية | الروابط في Q_2 |
| ضعيفة | قوية | ضعيفة | قوية | الروابط في RQ |

النظام المعزول

٤ مزدوج الحدود.

- ١ تسمح حدوده بانتقال المادة ولا تسمح بانتقال الحرارة.
- ٢ تسمح حدوده بانتقال الحرارة ولا تسمح بانتقال المادة.
- ٣ لا تسمح حدوده بانتقال أيّاً من الحرارة والمادة.



- (a) 0.54 kJ
- (b) 2.7 kJ
- (c) 5.4 kJ
- (d) 0.8 kJ

٥ تلزم كمية من الحرارة مقدارها 334 J لتحويل 1 g من الثلج إلى 1 g من الماء عند 0°C أيّاً من القيم الآتية تناسب هذه العملية ؟

(a) $q_p = 0$

(b) $\Delta H = 0$

(c) $\Delta H = +334 J$


(d) $\Delta H = -334 J$

٦ أيّاً من العبارات الآتية تُعبر عن نوع التفاعل الكيميائي الحادث عند احتكاك عود الثقاب بجسم خشن ؟

- ١ ماص للحرارة بسبب استخدام الطاقة عند حك عود الثقاب.
- ٢ ماص للحرارة بسبب انطلاق الطاقة عند احتراق عود الثقاب.
- ٣ طارد للحرارة بسبب استخدام الطاقة عند حك عود الثقاب.
- ٤ طارد للحرارة بسبب انطلاق الطاقة عند احتراق عود الثقاب.

حرارة التكوين القياسية	المركب
+ 49 kJ/mol	$C_6H_{6(l)}$
- 394 kJ/mol	$CO_{2(g)}$
- 286 kJ/mol	$H_2O_{(l)}$

يحترق البنزين C_6H_6 تبعاً للمعادلة التالية :



أينما من الحسابات الآتية يمكن بواسطتها تقدير حرارة الاحتراق القياسية للبنزين ؟

- (a) $[(12 \times -394) + (6 \times -286)] - (2 \times 49)$ (b) $[(12 \times 394) + (6 \times 286)] - (2 \times -49)$
 (c) $[(6 \times -394) + (3 \times -286)] - 49$ (d) $[(6 \times 394) + (3 \times 286)] - (-49)$


يلزم لرفع درجة حرارة g 15 من الفلز X من 25°C إلى 32°C كمية من الحرارة مقدارها J

ما قيمة الحرارة النوعية للفلز X °C ؟

- (a) 0.59 (b) 11.9 (c) 1.7 (d) 25.4

عند إمداد g 15.5 من الماء درجة حرارته 10°C 5 ، فإنه يظل سائلاً . (d) يجمد . (c) يتغير كلباً . (b) يغلي . (a) يعلو .

ما مقدار الطاقة المنطلقة عند احتراق $L \times 10^8$ 1.9 من غاز الهيدروجين، تبعاً للمعادلة :



علمًا بأن الحجم المولى من أي غاز يساوى (at STP) 22.4 L/mol



- (a) $8.64 \times 10^6 \text{ kJ}$ (b) $2.98 \times 10^{10} \text{ kJ}$ (c) $3.02 \times 10^4 \text{ kJ}$ (d) $2.43 \times 10^9 \text{ kJ}$

أينما من الاختيارات الآتية تعبر عن المركب الأكثر ثباتاً حراريًّا ؟

الاختيار	المركب	حرارة التكوين القياسية (kJ/mol)
(d)	CdO	-258
(c)	Cd(OH) ₂	-561
(b)	CdS	-162
(a)	CdSO ₄	-935


١ درجة

عبر عن التفاعل الآتى باكمال مخطط الطاقة الموضح :



١٢

المخطط التالي يوضح التغيرات الحادثة في الطاقة لعمليتين مختلفتين :



احسب ΔH للعملية $W \leftarrow Z$

١ درجة

١٣

تقدر حرارة الذوبان ΔH_{sol} من العلاقة : $\Delta H_{sol} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$

فإذا علمت أن ذوبان أكسيد الكالسيوم في الماء طارد للحرارة، فما قيمة من قيم ΔH السابقة تكون هي الأكبر ؟

وما الذي تعبّر عنه ؟

١ درجة

١٤



يستخدم في مسحير القنبلة غاز وسائل لا يتغيّران عند حساب حرارة احتراق أي مادة صلبة،

ما أهمية الغاز المستخدم ؟ وما اسم هذا السائل ؟

١ درجة

١٥

من المعادلتين التاليتين :



(١) أيّاً من المركبين السابقين يكون ذوبانه في الماء ماصاً للحرارة ؟

(ب) احسب كمية الحرارة (المنطلقة أو المتصنة) عند ذوبان 0.4 g من NaOH في الماء
علمًا بأن كتلته المولية 40 g/mol


١٦

إذا علمت أن حرارة احتراق الكربون تساوى 393.5 kJ/mol وأن حرارة احتراق الأسيتيлен C_2H_2 تساوى -1300 kJ/mol




اكتب المعادلة الكيميائية الحرارية المعتبرة عن حرارة تكوين كل من الأسيتيلين وثاني أكسيد الكربون من عناصرهما الأولية.

٣٢٤

٣٢٥

احسب ΔH للتفاعل ،

بمعلومية المعادلات الحرارية التالية :



الامتحان هدفنا تفوق وليس مجرد نجاح

الخامس

الكيمياء النووية



نواة الذرة و الجسيمات الأولية.

الفصل 1

النشاط الإشعاعي و التفاعلات النووية.

الفصل 2

أهداف الباب

بعد دراسة هذا الباب يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :

(١) يطبق العلاقة بين الكتلة و الطاقة بالوحدات المدخلة.

(٢) يميز بين التحول الطبيعي و التحول النووي للعناصر.

(٣) يحسب طاقة الترابط النووي بين جسيمات نواة ذرة عنصر.

(٤) يربط بين عدد البروتونات و النيوترونات و الكواركات.

(٥) يوضح تأثير اشعاعات إشعاعات (ألفا - بيتا - جاما) من نواة ذرة عنصر مشع.

(٦) يقارن بين التشطير النووي و الدندماج النووي.

(٧) يفسر الأساس العلمي للمفاعلات النووية.

(٨) يحسب الكتل الذرية للعناصر بمعلومية الكتل النسبية لنيظائرها.

(٩) يطبق العلاقة بين نسبة عدد النيوترونات إلى عدد البروتونات للعناصر ومدى ثباتها النووي.

(١٠) يستنتج فترة عمر النصف و كثافة دسائصها لعنصر مشع.

نواة الذرة و الجسيمات الأولية

- مكونات الذرة.
ما قبل القوى النووية القوية.
قوى النووية القوية.
نهاية الفصل.
- من الدرس الأول
الى الدرس الثاني

أهم المفاهيم

- الإلكترونات.
- العدد الكتلي.
- العدد الذري.
- النبؤات.
- النظائر.
- القوى النووية القوية.
- طاقة الترابط النووي.
- العنصر المستقر.
- العنصر غير المستقر.


نواتج التعلم

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :

- (١) يبين مكونات الذرة.
- (٢) يقارن بين نموذج رذرفورد ونموذج بور لوصف الذرة.
- (٣) يست年之 مفهوم النظائر ويدرك أمثلة منها.
- (٤) يحسب الطاقة الناتجة من تحويل كتلة معينة من مادة ما باستخدام معادلة أينشتاين.
- (٥) يست年之 خصائص القوى النووية القوية.
- (٦) يحسب طاقة الترابط النووي وطاقة الترابط النووي لذيل البروتون.
- (٧) يحدد مكونات البروتون و النبؤات من الكواركات.

أهم العناصر

- مكونات الذرة.
- النظائر.
- وحدة الكتل الذرية.
- حسابات تحويل الكتلة إلى طاقة.
- القوى النووية القوية.
- طاقة الترابط النووي.
- الاستقرار النووي.
- مفهوم الكوارك.
- تركيب البروتون و النبؤات.



مكونات الذرة

* تتكون المادة من ذرات، وهي التي يرجع إليها الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة.

اكتشاف الإلكترونات

* في نهاية القرن التاسع عشر :

• تأكد العلماء أن الإلكترونات من المكونات الأساسية في الذرة

الإلكترونات
جسيمات سالبة الشحنة، كتلتها ضئيلة جداً
تدور حول نواة الذرة.

وأنها جسيمات كتلتها ضئيلة جداً وشحنتها سالبة.

• استنتج العلماء أن الذرة تحتوي أيضاً على شحنات موجبة

مساوية لشحنة الإلكترونات السالبة وذلك بناءً على أن الذرة متعادلة كهربياً.


إلا أنه لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين، كيفية توزيع الشحنات الموجبة والسلبية في الذرة.

نموذج رذرфорد (1911) و بور (1913) لوصف الذرة

* ترتب على إجراء تجربة رذرфорد ونظيرية بور تغير جوهري في وصف تركيب الذرة،

كما يتضح مما يلي :

نموذج بور لوصف الذرة



فودج بور للذرة

نموذج رذرфорد لوصف الذرة



فودج رذرфорد للذرة

* تدور الإلكترونات سالبة الشحنة حول النواة،
في مدارات معينة ثابتة، أطلق عليها اسم
مستويات الطاقة.

* كل مستوى طاقة يشغله عدد محدد من
الإلكترونات لا يزيد عن.

* يوجد في مركز الذرة نواة :

• صغيرة موجبة الشحنة.

• ثقيلة نسبياً، تتركز فيها كتلة الذرة.

* تدور الإلكترونات سالبة الشحنة حول النواة على
بعد كبير نسبياً منها.

* الذرة معظمها فراغ، حيث أن حجم النواة صغير جداً
بالنسبة لحجم الذرة، حيث أثبتت حسابات رذرфорد أن :

• قطر الذرة حوالي (0.1 nm)

• قطر النواة يتراوح بين (10^{-5} nm : 10^{-6} nm)

اكتشاف البروتونات (1919)

- * أثبت العالم رذرфорد أن نواة الذرة تحتوى على جسيمات تحمل شحنة موجبة أطلق عليها اسم البروتونات.

اكتشاف النيوترونات (1932)

أيُّهما تم اكتشافه أولاً : البروتون أم النيوترون ؟
ولمن يرجع الفضل في اكتشافه ؟

- * اكتشف العالم شادويك أن النواة تحتوى على جسيمات متعادلة الشحنة، أطلق عليها اسم النيوترونات، وأن كتلة النيوترون تساوى تقريباً كتلة البروتون.

على :

(١) تتركز كتلة الذرة في النواة.
لضافة كتلة الإلكترونات مقارنة بكتلة النواة حيث إن كتلة البروتون أكبر من كتلة الإلكترون بحوالى 1800 مرة.


(٢) الذرة متعادلة كهربائياً.
لتتساوى عدد الشحنات الموجبة (البروتونات) داخل النواة مع عدد الشحنات السالبة (الإلكترونات)
التي تدور حول النواة.

وصف نواة ذرة عنصر


* يلزم لوصف نواة ذرة أي عنصر، معرفة الثلاثة مصطلحات التالية :

العلاقة	الرمز	المصطلح
عدد البروتونات + عدد النيوترونات	A	العدد الكتلي
عدد البروتونات = عدد الإلكترونات «في الذرة المتعادلة»	Z	العدد الذري
العدد الكتلي - عدد البروتونات $(N = A - Z)$	N	عدد النيوترونات

* ويمكن التعبير عن أي عنصر، كما يلى :



اكتب الرمز الكيميائي لنواة ذرة الألومنيوم، علماً بأنها تحتوى على 13 بروتون ، 14 نيوترون.



رمز نواة ذرة الألومنيوم

$$\therefore \text{العدد الكتلي (A)} = 27 = 14 + 13$$


الحل : ∵ النواة تحتوى على :

* 13 بروتون

* 14 نيوترون

النظائر

النظائر



نظائر العنصر الواحد تتفق في العدد الذري

وتحتارف في العدد الكتلى

ذرات العنصر الواحد التي تتفق في عددها الذري وتحتارف في عددها الكتلى، لاختلاف عدد النيوترونات في أنواعتها.

* تتفق نظائر العنصر الواحد في الخواص الكيميائية ... **علل** لاتفاقها في عدد الإلكترونات وترتيبها حول نواة ذرة كل نظير منها.

* معظم عناصر الجدول الدورى لها أكثر من نظير.

تطبيق ١ نظائر الهيدروجين.

* عنصر الهيدروجين - أبسط العناصر الموجدة في الطبيعة - له 3 نظائر، يوضحها الجدول التالي :

${}^3_1\text{H}$	${}^2_1\text{H}$	${}^1_1\text{H}$	رمز النظير
الтриتنيوم	الديوتيريوم	البروتون	اسم النظير
التربيتون	الديوتيرون	البروتون	اسم نواة النظير
			الشكل
1	1	1	العدد الذري
3	2	1	العدد الكتلى
1	1	1	عدد البروتونات
$3 - 1 = 2$	$2 - 1 = 1$	$1 - 1 = 0$	عدد النيوترونات

يتضح من الجدول السابق أن :

- * العدد الذري يتساوى مع العدد الكلى فى نواة البروتينوم ... **علل؟** لعدم احتوائها على نيوترونات.
- * عدد النيوترونات :
- يتساوى مع عدد البروتونات فى نواة ذرة الديوتيريوم.
- ضعف عدد البروتونات فى نواة ذرة التريتنيوم.

تطبيق ٢ نظائر الأكسجين.

* عنصر الأكسجين له 3 نظائر، يوضحها الجدول التالي :

$^{18}_8\text{O}$	$^{17}_8\text{O}$	$^{16}_8\text{O}$	النظير
8	8	8	عدد البروتونات
18	17	16	عدد النيوكلونات
$18 - 8 = 10$	$17 - 8 = 9$	$16 - 8 = 8$	عدد النيوترونات

لماذا يستحيل تواجد النظير $^{2}_2\text{He}$ ؟


لأن قوى التناهف الكهربى بين البروتونات وبعضها فى النواة لن يقابلها قوى تجاذب بين النيوترونات والبروتونات، لعدم وجود نيوترونات.

وحدة الكتل الذرية amu

- * لا تقدر كتل ذرات النظائر بوحدة كيلوجرام kg ... **علل؟** لأن كتلها صغيرة جداً.
 - * تقدر كتل ذرات النظائر بوحدة الكتل الذرية amu والتي تختصر إلى u وهي تعادل $1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- $$1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-24} \text{ g} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

* ويمكن تعين الكتل الذرية للعناصر بمعلومية الكتل الذرية النسبية لنظائرها ونسبة وجود كل منها.

أمثلة



نسبة وجود نظيرى عنصر النحاس
في الطبيعة

(١) احسب الكتلة الذرية لعنصر النحاس،

علمًا بأنه يتواجد في الطبيعة على هيئة نظيرين، هما :

^{63}Cu (نسبة وجوده 69%) ،

^{65}Cu (نسبة وجوده 30.91%)

$$[^{63}\text{Cu} = 62.9298 \text{ amu}, ^{65}\text{Cu} = 64.9278 \text{ amu}]$$



الحل : مساهمة نظير النحاس 63 في الكتلة الذرية = $\frac{69.09}{100} \times 62.9298$ u = 43.4782 u

مساهمة نظير النحاس 65 في الكتلة الذرية = $\frac{30.91}{100} \times 64.9278$ u = 20.0691 u

الكتلة الذرية لعنصر النحاس Cu = 20.0691 + 43.4782 = 63.5473 u

(٢) عينة من الليثيوم تحتوى على نظيرين، الأول نظير الليثيوم 6 وكتلته الذرية النسبية u 6.01572 والثانى نظير الليثيوم 7 وكتلته الذرية النسبية u 7.016 احسب الكتلة الذرية لعنصر الليثيوم، علمًا بأن نسبة وجود نظير الليثيوم 6 في العينة 7.42%


الحل : نسبة وجود نظير الليثيوم 7 في العينة = $92.58\% = 7.42 - 100$

مساهمة نظير الليثيوم 6 في الكتلة الذرية = $\frac{7.42}{100} \times 6.01572$ u = 0.4464 u

مساهمة نظير الليثيوم 7 في الكتلة الذرية = $\frac{92.58}{100} \times 7.016$ u = 6.4954 u

الكتلة الذرية لعنصر الليثيوم Li = 6.4954 + 0.4464 = 6.9418 u

حسابات تحويل الكتلة إلى طاقة



وضع العالم أينشتين معادلة رياضية توضح العلاقة بين الكتلة المتحولة والطاقة

* يمكن حساب الطاقة الناتجة عن تحول كتلة (مقدرة بالكيلوجرام kg) من مادة ما إلى طاقة (مقدرة بوحدة الجول J) بحل معادلة أينشتين.

$$E = m \times c^2$$


«معادلة أينشتين»

الطاقة بوحدة (J)	الكتلة المتحولة بوحدة (kg)	مربع سرعة الضوء في الفراغ يساوي $(3 \times 10^8 \text{ m/s})^2$
---------------------	-------------------------------	--

* ولحساب الطاقة الناتجة عن تحول كتلة (مقدرة بوحدة الكتل الذرية u)

من مادة ما إلى طاقة (مقدرة بوحدة مليون إلكترون فولت MeV)

تستخدم العلاقة :




$$\begin{aligned} 1 \text{ eV} &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \\ \therefore 1 \text{ MeV} &= 1 \times 10^6 \text{ eV} \\ \therefore 1 \text{ MeV} &= 1.6 \times 10^{-13} \text{ J} \end{aligned}$$

$$E = m \times 931$$

الطاقة (MeV) بوحدة	الكتلة (u) بوحدة	مقدار ثابت
--------------------------	------------------------	------------

* ويمكن إجمال العلاقات الساقية في المخطط التالي :



أمثلة

- (١) احسب كمية الطاقة الناتجة عن تحول 5 g من مادة إلى طاقة، مقدرة بوحدات :

(1) جول. (2) مليون إلكترون فولت.

الحل :

$$(1) m = \frac{5}{1000} = 0.005 \text{ kg}$$

$$E = m \times c^2$$

$$= 0.005 \times (3 \times 10^8)^2 = 4.5 \times 10^{14} \text{ J}$$

تحويل الكتلة من وحدة (kg) إلى وحدة (g)
بالقسمة على 1000

$$(2) m = \frac{5}{1.66 \times 10^{-24}} = 3.012 \times 10^{24} \text{ u}$$

$$E = m \times 931$$

$$= 3.012 \times 10^{24} \times 931 = 2.8 \times 10^{27} \text{ MeV}$$

$$(u) \text{ تحويل الكتلة من وحدة (g) إلى وحدة (} \times 10^{-24} \text{ بالقسمة على }$$

$$E = \frac{4.5 \times 10^{14}}{1.6 \times 10^{-13}} = 2.8 \times 10^{27} \text{ MeV}$$

* للتأكد من الحسابات :

$$\text{يتم قسمة الطاقة بوحدة (J)} \\ \text{على } 1.6 \times 10^{-13}$$



الدرس الأول

(١) احسب كمية الطاقة (بالچول) الناتجة عن تحول 25% من مادة مشعة كتلتها 1.4 g إلى طاقة.

الحل :

$$m = 1.4 \times \frac{25}{100} = 0.35 \text{ g}$$

$$E = m \times c^2 = \frac{0.35}{1000} \times (3 \times 10^8)^2 = 3.15 \times 10^{13} \text{ J}$$

(٢) احسب الكتلة بالكيلوجرام التي تتحول إلى طاقة مقدارها 190 MeV

الحل :

$$m(u) = \frac{E}{931} = \frac{190}{931} = 0.2 \text{ u}$$

حساب الكتلة بوحدة (u)

$$m(\text{kg}) = 0.2 \times 1.66 \times 10^{-27}$$

$$= 3.32 \times 10^{-28} \text{ kg}$$

تحويل الكتلة من وحدة (u) إلى وحدة (kg)


1.66×10^{-27} بالضرب في



القوى النووية القوية

* تحافظ أنيونات الذرات على استقرارها وتماسكها بالرغم من حالة قوى التجاذب المادي بين النيوكلونات وبعضاً منها، مقارنة بقوى التناحر الكهربائي (قوى كهروستاتيكية) بين البروتونات وبعضاً منها ... **علل؟**

لوجود قوى أخرى قوية تعمل على ترابط النيوكلونات ببعضها لضمان استقرار أنيونات الذرات المستقرة تعرف باسم القوى النووية القوية.



القوى النووية القوية

قوى تعمل على ترابط النيوكلونات داخل النواة.

علل: تسمى القوى التي تعمل على ترابط النيوكلونات ببعضها باسم القوى النووية القوية.

لأن تأثيرها على النيوكلونات كبير جدًا داخل الحيز الصغير للنواة.

خصائص القوى النووية القوية

(١) ذات قوة هائلة.

(٢) لا تعتمد على شحنة النيوكلونات ... **علل؟**

لأنها تكون بين :

- بروتون و بروتون.
- نيوترون و نيوترون.
- بروتون و نيوترون.

(٣) تعمل في مدى قصير (أي لا يبدأ التجاذب بين النيوكلونات، إلا عندما تكون المسافة بينها صغيرة للغاية).

اكتب نبذة عن خصائص القوى النووية القوية.





شكل تخيلي قائم فيه
النيوكلونات بالكرات
والقوى النووية القوية باللون الأزرق

طاقة الترابط النووي

* أثبتت جميع القياسات الدقيقة لكتل الأنوبي المختلفة، أن كتلة النيوكلونات المترابطة (الكتلة الفعلية للنواة) تكون أقل من مجموع كتل النيوكلونات الحرة (الكتلة النظرية للنواة).

حيث أن : مقدار النقص في الكتلة = الكتلة النظرية - الكتلة الفعلية



شكل تخيلي لنواة ذرة الهيليوم ${}^4_2\text{He}$

* مقدار النقص في الكتلة = الكتلة النظرية - الكتلة الفعلية

$$0.03038 \text{ u} = (4.00150) - (4.03188)$$

علل : الكتلة الفعلية لنواة أي ذرة أقل من مجموع كتل مكوناتها.

تحول جزء من كتلة مكونات النواة إلى طاقة لربط تلك المكونات بعضها.

* وقد وجد أن مقدار النقص في كتلة النيوكلونات يتحول إلى طاقة لربط مكونات النواة ببعضها، تُعرف بطاقة الترابط النووي.

طاقة الترابط النووي

كمية الطاقة المكافئة لمقدار النقص في كتلة مكونات النواة.

* يمكن حساب طاقة الترابط النووي باستخدام قانون أينشتاين، كالتالي :

$$\text{طاقة الترابط النووي (BE)} = \frac{\text{النقص في الكتلة}}{\text{كتلة المتحولة}} \times 931 \text{ MeV}$$

* وتسمي القيمة التي يساهم بها كل نيوكلون في طاقة الترابط النووي بطاقة الترابط النووي لكل نيوكلون، والتي يمكن حسابها من العلاقة :

$$\text{طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون} = \frac{\text{طاقة الترابط النووي الكلية (BE)}}{\text{عدد النيوكلونات «العدد الكلي» (A)}}$$

اذكر العلاقة بين ثبات نواة ذرة العنصر
وطاقة الترابط النووي لكل نيوكلون بها.

* وتعتبر طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون $\left(\frac{\text{BE}}{\text{A}}\right)$ مقياساً مناسباً لمدى الاستقرار النووي ... **علل** ؟

لأن ثبات الأنوية يزداد بزيادة قيمة $\left(\frac{\text{BE}}{\text{A}}\right)$ لها.

امثلة

(١) احسب طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون في نواة ذرة الهيليوم $^{4}_{2}\text{He}$ علماً بأن كتلتها الفعلية تساوى 4.00150 u وكلة كل من البروتون والنيوترون $1.00728 \text{ u} , 1.00866 \text{ u}$ على الترتيب.

فكرة الحل :

$$\begin{aligned} \text{الكتلة النظرية} \\ (1.00866 \times 2) + (1.00728 \times 2) = \\ 2.01732 + 2.01456 = \\ 4.03188 \text{ u} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ① \text{ حساب الكتلة النظرية لمكونات النواة من العلاقة :} \\ \text{الكتلة النظرية} = (\text{عدد البروتونات} \times \text{كتلة البروتون}) \\ + (\text{عدد النيوترونات} \times \text{كتلة النيوترون}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{النقص في الكتلة} = 4.00150 - 4.03188 \\ 0.03038 \text{ u} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ② \text{ حساب النقص في كتلة مكونات النواة من العلاقة :} \\ \text{النقص في الكتلة} = \text{الكتلة النظرية} - \text{الكتلة الفعلية} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 931 \times 0.03038 = \text{BE} \\ 28.28378 \text{ MeV} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ③ \text{ حساب طاقة الترابط النووي من العلاقة :} \\ \text{طاقة الترابط النووي} = 931 \times \text{الكتلة} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{28.28378}{4} = \frac{\text{BE}}{\text{A}} \\ 7.070945 \text{ MeV} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ④ \text{ حساب طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون من العلاقة :} \\ \text{طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون} = \frac{\text{طاقة الترابط النووي الكلية}}{\text{عدد النيوكلونات}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (٢) \text{ احسب الكتلة الفعلية لنواة ذرة السيليكون } ^{28}_{14}\text{Si} \\ * \text{ كتلة البروتون} = 1.00728 \text{ u} \\ * \text{ كتلة النيوترون} = 1.00866 \text{ u} \\ * \text{ طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون بها} = 8.21275 \text{ MeV} \end{aligned}$$

الحل :

طاقة الترابط النووي = طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون \times عدد النيوكلونات

$$229.957 \text{ MeV} = 28 \times 8.21275 =$$

$$\text{النقص في الكتلة} = \frac{\text{طاقة الترابط النووي}}{931} = \frac{229.957}{931} \text{ u}$$

$$\begin{aligned} \text{عدد النيوترونات} &= \text{العدد الكلى} - \text{العدد الزرى} \\ 14 - 28 &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{الكتلة النظرية} &= (\text{عدد البروتونات} \times \text{كتلة البروتون}) + (\text{عدد النيوترونات} \times \text{كتلة النيوترون}) \\ 28.22316 \text{ u} &= (1.00866 \times 14) + (1.00728 \times 14) = \end{aligned}$$

$$\text{الكتلة الفعلية} = \text{الكتلة النظرية} - \text{النقص في الكتلة}$$

$$27.97616 \text{ u} = 0.247 - 28.22316 =$$

(٣) احسب طاقة الترابط النووي بوحدة الجول لنواة ذرة ما، علماً بأنَّ 6.015 u كتلتها الفعلية $=$

$$\begin{aligned} * \text{قيمة } A \text{ لها} &= 6 \\ * \text{قيمة } Z \text{ لها} &= 3 \end{aligned}$$

$$* \text{كتلة البروتون} = 1.00728 \text{ u} \quad * \text{كتلة النيوترون} = 1.00866 \text{ u}$$

الحل: عدد النيوترونات (N) = العدد الكتلي (A) - العدد الذري (Z)

$$= 3 - 6 = 3 \text{ نيوترون}$$

الكتلة النظرية = (عدد البروتونات × كتلة البروتون) + (عدد النيوترونات × كتلة النيوترون)

$$6.04782 \text{ u} = 3.02598 + 3.02184 = (1.00728 \times 3) + (1.00866 \times 3)$$

النقص في الكتلة = الكتلة النظرية - الكتلة الفعلية = $6.015 - 6.04782 \text{ u} = 0.03282 \text{ u}$

حل آخر: يتم تحويل النقص في الكتلة من وحدة u إلى وحدة kg بالضرب في 1.66×10^{-27}

$$1.66 \times 10^{-27} \times 0.03282 = \text{النقص في الكتلة (kg)}$$

$$5.44812 \times 10^{-29} \text{ kg} =$$

طاقة الترابط النووي (J) = النقص في الكتلة $\times c^2 \times (\text{kg})$

$$(3 \times 10^8)^2 \times 5.44812 \times 10^{-29} =$$

$$4.9 \times 10^{-12} \text{ J} =$$

طاقة الترابط النووي (BE) = النقص في الكتلة $\times 931$

$$931 \times 0.03282 =$$

$$30.55542 \text{ MeV} =$$

طاقة الترابط النووي (J)

= طاقة الترابط النووي (MeV) $\times 1.6 \times 10^{-13}$

$$1.6 \times 10^{-13} \times 30.55542 =$$

$$4.9 \times 10^{-12} \text{ J} =$$

(٤) أيًّا من النظيرين (الأكسجين O_8^{16} / الأكسجين O_8^{17}) أكثر استقراراً؟ مع تعليل إجابتك.

علماً بأنَّ * الكتلة الفعلية للنظير (O_8^{16}) $= 15.994915 \text{ u}$ * الكتلة الفعلية للنظير (O_8^{17}) $= 16.999132 \text{ u}$

$$* \text{كتلة البروتون} = 1.00728 \text{ u}$$

$$* \text{كتلة النيوترون} = 1.00866 \text{ u}$$

الحل:

نظير الأكسجين O_8^{17}

نظير الأكسجين O_8^{16}

الكتلة النظرية

$$17.13618 \text{ u} = (1.00866 \times 9) + (1.00728 \times 8)$$

$$16.12752 \text{ u} = (1.00866 \times 8) + (1.00728 \times 8)$$

النقد في الكتلة

$$0.137048 \text{ u} = 16.999132 - 17.13618$$

$$0.132605 \text{ u} = 15.994915 - 16.12752$$

طاقة الترابط النووي

$$127.591688 \text{ MeV} = 931 \times 0.137048 = BE$$

$$123.455255 \text{ MeV} = 931 \times 0.132605 = BE$$

طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون

$$7.5 \text{ MeV} = \frac{127.591688}{17} = \frac{BE}{A}$$

$$7.7 \text{ MeV} = \frac{123.455255}{16} = \frac{BE}{A}$$

∴ النظير O_8^{16} أكثر استقراراً من النظير O_8^{17} لأن مقدار طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون $\frac{BE}{A}$ فيه أكبر.



(٥) احسب العدد الذري لعنصر ما، علماً بأنَّ :

* طاقة الترابط النووي الكلية $L_e = 27.36 \text{ MeV}$

* طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون في نواة ذرته $= 6.84 \text{ MeV}$

* كتلة النيوترونات $= 2.01732 \text{ u}$ * كتلة النيوترون $= 1.00866 \text{ u}$

الحل :

$$4 = \frac{27.36}{6.84} = \frac{\text{طاقة الترابط النووي الكلية}}{\text{طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون}}$$

$$\frac{\text{كتلة النيوترونات}}{\text{كتلة النيوترون}} = \frac{2.01732}{1.00866} = 2 \text{ نيوترون}$$

$$\text{العدد الذري} = \text{عدد النيوكلونات} - \text{عدد النيوترونات} = 4 - 2 = 2$$

الدستقرار النووي

* يستخدم مصطلح الاستقرار (الثبات) لوصف مدى قابلية أنوية ذرات العناصر للانحلال، وعلى هذا الأساس تم تصنيف العناصر تبعاً لثبات أنوية ذراتها إلى :

عناصر غير مستقرة

العنصر غير المستقر

عنصر تتحلل نواة ذرته بمرور الزمن، نتيجة حدوث نشاط إشعاعي.

عناصر مستقرة

العنصر المستقر

عنصر تبقى نواة ذرته ثابتة بمرور الزمن، دون حدوث أي نشاط إشعاعي.

* وتحدد النسبة بين عدد النيوترونات إلى عدد البروتونات ($\frac{N}{Z}$) مدى استقرار الأنوية.


* **الشكل البياني المقابل** يوضح العلاقة بين عدد النيوترونات وعدد البروتونات لأنوية ذرات عناصر الجدول الدوري ومنه يتضح أنَّ :

(١) أنوية ذرات العناصر المستقرة :

- تشكل منطقة تتحرف قليلاً إلى اليسار عن الخط الذي يمثل $N = Z$ وتعرف هذه المنطقة بحزام الاستقرار Belt of stability


- تكون فيها النسبة $\frac{N}{Z}$ تساوي 1، أي يتساوي فيها عدد النيوترونات مع عدد البروتونات في حالة العناصر المستقرة الخفيفة (التي يقل عدد النيوكلوناتها فيها عن 38) مثل الكربون $^{12}_6$ ، الأكسجين $^{16}_8$

- بزيادة العدد الذري لهذه العناصر تزداد النسبة $\frac{N}{Z}$ تدريجياً حتى تصل إلى حوالي 1.53 في نظير الرصاص $^{208}_{82}\text{Pb}$




شكل الأنوية المستقرة ما يُعرف بحزام الاستقرار

(٢) **أنوبيذرات العناصر غير المستقرة :**
تقع يمين أو يسار أو أعلى حزام الاستقرار، ولكن تصل إلى حالة الاستقرار ينبع منها جسيمات من خلال نشاط إشعاعي، كما يتضح من الشكلين التاليين :



كيفية وصول أنوية ذرات العناصر
غير المستقرة إلى حالة الاستقرار



موقع أنوية ذرات العناصر غير المستقرة بالنسبة لحزام الاستقرار

* الحدود المتأتية بفرض حسب عددها ستة، لأنهاية الذات وكيفية وصولها لحالة الاستقرار:

موقع الأنوية غير المستقرة	سبب عدم استقرار أنوية الذرات	كيفية وصول الأنوية غير المستقرة لحالة الاستقرار
يسار حزام الاستقرار مثل ^{14}C	عدد النيوترونات فيها أكبر من حد الاستقرار «النسبة $\frac{N}{Z}$ كبيرة»	بانبعاث جسيم بيتا (إلكترون نواة سالب) ${}^{\beta^-}$ من نواة ذرة العنصر غير المستقر ... علل؟ لتحويل أحد النيوترونات الزائدة إلى بروتون حتى تتعادل النسبة $(\frac{N}{Z})$ لتقترب من حزام الاستقرار
يمين حزام الاستقرار مثل ^{35}K	عدد البروتونات فيها أكبر من حد الاستقرار «النسبة $\frac{N}{Z}$ صغيرة»	بانبعاث بوزيترون (إلكترون نواة موجب) ${}^{\beta^+}$ من نواة ذرة العنصر غير المستقر ... علل؟ لتحويل أحد البروتونات الزائدة إلى نيوترون حتى تتعادل النسبة $(\frac{N}{Z})$ لتقترب من حزام الاستقرار
أعلى حزام الاستقرار مثل ^{238}U	عدد النوكليونات فيها أكبر من حد الاستقرار	بانبعاث دقيقة الفا (${}^4\text{He}$) من نواة ذرة العنصر غير المستقر ... علل؟ لفقد (2 بروتون ، 2 نيوترون) لتقترب من حزام الاستقرار



(١) ادرس الشكل المقابل، ثم أجب عما يلى :

(١) ما الذى يمثّل (X) ؟

(٢) (A) ، (B) ، (C) تمثل مواضع ثلاثة

أنوبي لذرات عناصر غير مستقرة، أى من

هذه الأنوبية يكتسب استقراراً بانبعاث :

(١) دقيقة بيتا β^- (ب) بوزيترون β^+

مع تفسير إجابتك.

الحل :


(١) حزام الاستقرار.

(٢) نواة العنصر (A) / لأن عدد النيوترونات فيها

أكبر من حد الاستقرار «النسبة $\frac{N}{Z}$ كبيرة».

(ب) نواة العنصر (C) / لأن عدد البروتونات فيها

أكبر من حد الاستقرار «النسبة $\frac{N}{Z}$ صغيرة».



(٢) العناصر X ، Y لهما نفس العدد من النيوكلونات، فإذا كانت النسبة $\frac{N}{Z}$ للعنصر X تساوى 1 وللعنصر Y تساوى 1.5 استنتج الرمز الكيميائى لنواة ذرة العنصر المستقر Y، علمًا بأن نواة العنصر X تحتوى على 5 بروتونات.

الحل :

* بالنسبة للعنصر (X) :

$$\therefore \frac{N}{Z} = 1 \quad , \quad Z = 5 \quad \therefore N = 5$$

∴ عدد النيوكلونات فى نواة أيّاً من العنصر X أو العنصر Y = 5 + 5 = 10 نيوكلون

∴ N : Z = 1.5 : 1 = 6 : 4 * بالنسبة للعنصر (Y) :

$$\therefore N = 6 \quad , \quad Z = 4$$

∴ الرمز الكيميائى لنواة ذرة العنصر : ${}^{10}_4 Y$



مورى جيلمان


مفهوم الكوارك

- * أثبت العالم مورى جيلمان فى عام 1963 أن البروتونات عبارة عن تجمع جسيمات أولية، أطلق عليها مصطلح الكواركات، حيث :
 - يتميز كل منها برقم يرمز له بالرمز Q يعبر عن شحنته.
 - تأخذ قيم منسوبة لشحنة الإلكترون ($e - \frac{1}{3}$ أو $e + \frac{2}{3}$)
 - يبلغ العدد المعروف منها ستة أنواع.

* المخطط التالي يوضح تصنيف الكواركات ببعضها البعض لقيم Q كل منها :



تركيب البروتون و النيوترون



الشحنة الكهربائية للبيوترون Q متعادلة ... علل؟

الشحنة الكهربائية للبروتون Q_p موجبة ... على ؟

لأن شحنة النيونترون تساوى مجموع شحنات الكاركات المكونة له.

$$Q_n = u + d + d = \frac{2}{3} + (-\frac{1}{3}) + (-\frac{1}{3}) = 0$$


لأن شحنة البروتون تساوى مجموع شحنات الكواركات المكونة له.

$$Q_p = d + u + u \\ = -\frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} = +1e$$

أمثلة

(١) وضح تركيب الكواركات في نواة ذرة الهيليوم ${}^4_2\text{He}$


الحل :



تركيب الكواركات في نواة ذرة الهيليوم ${}^4_2\text{He}$

* تتركب نواة ذرة الهيليوم من :

- 2 بروتون (يتتركب كل منها من ارتباط 1 كوارك سفلي d مع 2 كوارك علوي u).
- 2 نيوترون (يتتركب كل منها من ارتباط 1 كوارك علوي u مع 2 كوارك سفلي d).



(٢) ادرس الشكل المقابل، ثم أجب عن الأسئلة التالية :

(١) ما الذي يعبر عنه كل من الشكلين (A) ، (B) ؟ مع حساب الشحنة الكهربية لكل منها.

(ب) عما يعبر الجسيم (X) ؟ وما نوع شحنته ؟

الحل :

(A) : نيوترون (n). (B) : بروتون (p).

$$* Q_n = \frac{2}{3} + \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$$

$$* Q_p = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = +1 e$$

(ب) جسيم بيتا β^- / شحنة سالبة.

(٣) عنصر عدد الذرى 9 وتحتوى نواة ذرته على 29 كوارك سفلى، احسب :

(أ) العدد الكتلى للعنصر. (ب) عدد الكواركات العلوية فى نواة ذرة العنصر.

الحل :

(أ) عدد البروتونات = العدد الذرى = 9 بروتون.

: كل بروتون يتتركب من ارتباط 1 كوارك سفلي d مع 2 كوارك علوي u

: عدد الكواركات السفلية المكونة للبروتونات = 9 كوارك سفلى.

: عدد الكواركات السفلية المكونة للنيوترونات = $29 - 9 = 20$ كوارك سفلى.

: كل نيوترون يتتركب من ارتباط 1 كوارك علوي u مع 2 كوارك سفلي d

: عدد النيوترونات = $\frac{20}{2} = 10$ نيوترون.

: العدد الكتلى للعنصر = عدد البروتونات + عدد النيوترونات = $9 + 10 = 19$

(ب) عدد الكواركات العلوية فى نواة ذرة العنصر = عدد الكواركات العلوية المكونة للبروتونات + عدد الكواركات العلوية المكونة للنيوترونات

= 28 كوارك علوي $= (10 \times 1) + (9 \times 2)$

النشاط الإشعاعي والتفاعلات النووية

- التفاعلات النووية.
- ما قبل تفاعلات التدول النووي (العنصري).
- تفاعلات التدول النووي (العنصري).
- نهاية الفصل.

الدرس الأول

الدرس الثاني

أهم المفاهيم

- التفاعلات النووية.
- عمر النصف.
- تفاعلات التدول النووي (العنصري).
- التفاعل المتسلسل.
- الحجم الحراري.
- الاندماج النووي.
- الإشعاعات المؤينة.
- الإشعاعات غير المؤينة.


نواتج التعلم

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن :

- (١) يتعرف النشأة التاريخية لمفهوم النشاط الإشعاعي.
- (٢) يحدد أنواع الإشعاعات الصادرة من العناصر المشعة ويدرك خواصها.
- (٣) يقارن بين أشعة ألفا وبيتا وجاما.
- (٤) يحسب عمر النصف لبعض العناصر.
- (٥) يوضح كيفية إتمام تفاعلات التدول النووي (العنصري).
- (٦) يذكر فكرة عمل المفاعل النووي الانشطاري وأهميته.
- (٧) يقارن بين تفاعلات الانشطار النووي والاندماج النووي.
- (٨) يفسر الأساس العلمي للمفاعلات النووية.
- (٩) يحدد أهمية التفاعلات النووية في بعض المجالات.

أهم العناصر

- * التفاعلات النووية.
- * تفاعلات التدول الطبيعي للعناصر.
- * عمر النصف.
- * تفاعلات التدول النووي (العنصري).
- * تفاعلات الانشطار النووي.
- * تفاعلات الاندماج النووي.
- * الاستخدامات السلمية للنظائر المشعة.
- * الآثار الضارة للإشعاعات النووية.



التفاعلات النووية

* تختلف التفاعلات النووية عن التفاعلات الكيميائية ... **على ؟**

لأن التفاعلات الكيميائية تتم بين ذرات العناصر المتفاعلة عن طريق إلكترونات مستويات الطاقة الخارجية لها، في حين لا يحدث تغير في أنوية هذه الذرات، أما في التفاعلات النووية فيؤدي تصادم أنوية ذرات العناصر المتفاعلة ببعضها إلى حدوث تغير في تركيبها ينتج عنه تكون أنوية ذرات عناصر جديدة.

التفاعلات النووية

تفاعلات تتضمن تغير في تركيب أنوية ذرات العناصر المتفاعلة عند تصادمها وتكون أنوية ذرات عناصر جديدة.

* وتصنف التفاعلات النووية إلى أربعة أنواع، هي :

أولاً

تفاعلات التحول الطبيعي للعناصر (النشاط الإشعاعي الطبيعي)

ثانياً

تفاعلات التحول النووي (العنصري)

ثالثاً

تفاعلات الاندماج النووي


رابعاً
تفاعلات الاندماج النووي

أولاً

تفاعلات التحول الطبيعي للعناصر



ماري كوري



الإشعاعات الصادرّة من مركب اليورانيوم تخترق الورق ولكنها لا تخترق الأجسام المعدنية

اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي

* في عام 1896 اكتشف العالم هنري بيكريل - عن طريق الصدفة - ظاهرة انتشار إشعاعات غير مرئية من أحد مركبات اليورانيوم.

* وفي عام 1898 أطلقت ماري كوري على هذه الظاهرة، مصطلح النشاط الإشعاعي.

ما دور كل من هنري بيكريل و ماري كوري في مجال الكيمياء النووية؟



* وانصب اهتمام الباحثين بعد ذلك على معرفة طبيعة الإشعاعات المنبعثة من المواد المشعة ومقارنتها واتبعوا في ذلك طريقتان، هما :

• اختبار مقدرة هذه الإشعاعات على اختراق المواد.

• مقارنة مدى انحراف هذه الإشعاعات بتأثير كل من المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي.

* وقد دلت التجارب على أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الإشعاعات

تنبع من المواد ذات النشاط الإشعاعي الطبيعي، وهي :

أشعة جاما

٣

أشعة بيتا

٤

أشعة ألفا

١

أشعة (دقائق) ألفا α

علل: اختلاف دققيقة ألفا عن ذرة الهيليوم،
رغم أن رمز كل منها ${}^4_2\text{He}$
لأن دققيقة ألفا موجبة الشحنة، بينما
ذرة الهيليوم متعادلة الشحنة.

* دققيقة ألفا α عبارة عن نواة ذرة هيليوم،

حيث تتكون من 2 بروتون ، 2 نيوترون،

ويرمز لها بالرمز ${}^4_2\text{He}$

* انبعاث دققيقة ألفا α من نواة ذرة عنصر مشع

يؤدي إلى حدوث تحول عنصري ... **علل؟**

لتكون عنصر جديد :


عدد الذرى أقل بمقدار 2 ،

وعدد الكلى أقل بمقدار 4

بالنسبة للنواة الأم.



تطبيقات: انبعاث دققيقة ألفا من نواة ذرة اليورانيوم 238 المشع.




* ويلاحظ أن :

- العدد الكلى A للنواة الأم = مجموع الأعداد الكلية لكل من النواة الناتجة (الوليدة) ودقيقة ألفا.

- العدد الذرى Z للنواة الأم = مجموع الأعداد الذرية لكل من النواة الناتجة (الوليدة) ودقيقة ألفا.

علل: تُعتبر أى معادلة نووية موزونة.


لأن مجموع كل من الأعداد الكلية والذرية لالمتفاعلات
يساوى مجموع الأعداد الكلية والذرية للنواتج.





مثال

اكتب المعادلة النووية الدالة على فقد دقیقة ألفا من نظیر الرادیوم Ra^{220}_{88} لتکوین نظیر الرادون Rn



الحل :

أشعة (دقائق) بتا- β

* يُطلق على دقة بيتا- β اسم إلكترون النواة ... **علٰى** لأنها تحمل صفات الإلكترون من حيث الكتلة والشحنة والسرعة.


* يمكن إهمال كتلة دقيقة بيتا ... علٰى
لضالتها بالنسبة لوحدة الكتل الذرية.

* يرمز لحقيقة بيتا بالرمز $e^{\frac{0}{1}} \dots$ عل؟

لأن الرمز e_1 يعني أن شحنته تعادل وحدة الشحنات السالبة، و 0 يعني أن كتلتها مهملة مقارنة بكتلة البروتون والنيوترون.

* أبعاث دقيقة (جسيم) بيتا $-\beta$ من نواة ذرة عنصر مشع يؤدي إلى تكون عنصر جديد عدده الذري أكبر بمقدار 1 ، بينما عدده الكتلي (عدد النيوكلونات) لا يتغير (يظل كما هو) بالنسبة للنواة الأم ... على

لأن جسيم بيتا e^- ينتج من تحول نيوترون إلى بروتون.



انبعاث دقيقة بيتا من نواة غير مستقرة


انبعاث دقيقة بيّنا من نواة ذرة الكربون 14 المشع.



انبعاث دقيقة بيتا من نواة ذرة كربون غير مستقرة


* ويلاحظ أن :

- العدد الكتلي A للنواة الأم = مجموع الأعداد الكتليلية لكل من النواة الناتجة (الوليدة) وجسيم بيتا.
- العدد الذري Z للنواة الأم = مجموع الأعداد الذرية لكل من النواة الناتجة (الوليدة) وجسيم بيتا.




أمثلة

(١) اكتب المعادلة النووية الدالة على فقد دقة بيتا من نظير الصوديوم $^{24}_{11}\text{Na}$ لتكون نظير الماغنيسيوم Mg



(٢) اكتب العدد الكتلي والعدد الذري لعنصر مشع يتحول إلى عنصر مستقر عدده الذري 82 وعده الكتلي 206
بعدما يفقد 5 جسيمات ألفا و 4 جسيمات بيتا.




$$A = 206 + (5 \times 4) + (4 \times 0) = 226$$

العدد الكتلي

$$Z = 82 + (5 \times 2) + (4 \times -1) = 88$$

العدد الذري

(٣) استنتج أعداد جسيمات ألفا و جسيمات بيتا المنبعثة أثناء تحول اليورانيوم $^{238}_{92}\text{U}$ إلى الرصاص $^{206}_{82}\text{Pb}$



$$238 = 206 + (X \times 4) + (Y \times 0)$$


$$238 = 206 + 4X \quad \therefore X = 8$$

عدد جسيمات ألفا

$$92 = 82 + (X \times 2) + (Y \times -1)$$

$$92 = 82 + (8 \times 2) - Y \quad \therefore Y = 6$$


عدد جسيمات بيتا



(٤) من الشكل المقابل استبدل الأرقام من (١) : (٤)


بأربعة تفاعلات نوية تدل على نشاط إشعاعي طبيعي،
بمعلومية رموز العناصر المشعة وأعدادها الذرية
الموضحة بالجدول التالي :

العنصر	Pu	Am	Np	U	Pa
Z	94	95	93	92	91



أشعة جاما γ

٣



انبعاث أشعة جاما من نواة ذرة عنصر مشع

* خصائص أشعة جاما γ :

- عبارة عن موجات كهرومغناطيسية (فوتونات) عديمة الكتلة والشحنة.
- طولها الموجى قصير جداً.
- سرعتها تساوى سرعة الضوء.
- ترددتها كبيرة.
- طاقة فوتوناتها عالية ... **علل ؟**



لكر تردد موجاتها وصغر أطوالها الموجية، حيث تعتبر أقصر الموجات الكهرومغناطيسية بعد الأشعة الكونية.

* انبعاث أشعة جاما من نواة ذرة عنصر مشع لا يؤدى إلى حدوث تغير في العدد الكلى أو العدد الذرى ... **علل ؟**
لأنها عباره عن موجات كهرومغناطيسية (فوتونات) عديمة الكتلة والشحنة.

* يمكن تلخيص تأثير انبعاث كل من ألفا ، بيتا ، جاما من أنوية الذرات فى الجدول التالى :

التأثير على	ألفا α ({}_2^4\text{He})	بيتا -β ({}_1^0\text{e})	جاما γ
عدد البروتونات	يقل بمقدار 2	يزداد بمقدار 1	لا يحدث تغير
العدد الذرى	يقل بمقدار 2	يزداد بمقدار 1	لا يحدث تغير
عدد النيوترونات	يقل بمقدار 2	يقل بمقدار 1	لا يحدث تغير
العدد الكلى	يقل بمقدار 4	لا يحدث تغير (يظل كما هو)	لا يحدث تغير

مقارنة بين إشعاعات ألفا وبيتا وجاما



الكتاب المفتوح

أشعة جاما	أشعة بيتا	أشعة ألفا	أوجه المقارنة
γ	β^-	α	الرمز
موجات كهرومغناطيسية (فوتونات)	إلكترون نواة ${}_{-1}^0 e$	نواة ذرة هيليوم ${}_{2}^4 He$	الطبيعة
عديمة الكتلة	$\frac{1}{1800}$ من كتلة البروتون	أربعة أمثال كتلة البروتون تقريباً	الكتلة
عديمة الشحنة	سالبة الشحنة	موجبة الشحنة	الشحنة
عالية جداً « تستطيع النفاذ خلال شريحة من الرصاص سُمكها عدة سنتيمترات وإن كانت شدتها تقل أثناة النفاذ »	متوسطة « لا يمكنها النفاذ من شريحة الألومنيوم سُمكها 5 mm »	ضعيفة « لا يمكنها النفاذ من ورقة كراسة »	القدرة على النفاذ
منخفضة	عالية	عالية جداً	القدرة على تأمين ذرات الوسط الذي تمر به
لا تتأثر بال المجال الكهربائي	تنحرف انحرافاً كبيراً ناحية القطب الموجب	تنحرف قليلاً ناحية القطب السالب	التأثير بال المجال الكهربائي
لا تتأثر بال المجال المغناطيسي	تتأثر بانحراف كبير	تتأثر بانحراف صغير	التأثير بال المجال المغناطيسي

قارن بين أشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة جاما.



* استنتاج العلماء من دراسة النشاط الإشعاعي أن :

- نشاط المادة المشعة يقل بمرور الزمن.


- عدد أتومات ذرات كل عنصر تتحلل إلى النصف

بعد مرور فترة زمنية محددة أطلقوا عليها

مصطلح عمر النصف $\frac{1}{2}$

عمر النصف

الزمن اللازم لتحلل عدد أتومات ذرات العنصر المشع إلى النصف.



العلاقة بين عدد الأتومات المشعة وزمن عقلها

الزمن (zero)

بعد مرور زمن عمر نصف (1)

الكمية الأصلية من العنصر المشع

متاحل 1/2

بعد مرور زمن عمر نصف (2)

متاحل 1/4

بعد مرور زمن عمر نصف (3)

متاحل 3/4

متاحل 7/8

وهكذا

ويحسب عمر النصف $\frac{1}{2}$ من العلاقة :

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{D}{\text{عدد مرات التحلل}}$$

* ويمكن تحديد عمر الصخور والموبياوات بدلالة عمر النصف لنظير الكربون 14

ما أهمية معرفة عمر النصف للناظار

المشعة بالنسبة لعلماء الجيولوجيا ؟



ما هي مدة النصف لذرة اليود 131؟

يختفي عدد ذرات اليود المشع 131 إلى النصف بعد 8 أيام

أي أن المدة اللازمة لتتحلل نصف عدد ذرات اليود 131 إلى نصف عدد الأصلية في عينة منه يساوي 8 أيام


تطبيق التحلل الإشعاعي لنظير اليود 131

* إذا كان لدينا عينة من اليود 131 كتلتها 100 g، فإن كتلتها ستتناقص إلى النصف بعد مرور كل زمن نصف (8 days).

كما يتضح من الجدول والشكل التاليين:

الكتلة المتبقية (g)	الزمن (day)
100	0
$100 \div 2 = 50$	$0 + 8 = 8$
$50 \div 2 = 25$	$8 + 8 = 16$
$25 \div 2 = 12.5$	$16 + 8 = 24$

وهكذا

**أمثلة**

(١) احسب عمر النصف لعنصر مشع، إذا علمت أن عينة منه كتلتها 12 g يبقى منها 1.5 g بعد مرور 45 days.

$$12 \xrightarrow{(1)} 6 \xrightarrow{(2)} 3 \xrightarrow{(3)} 1.5 \quad \text{الحل:}$$

$$\therefore D = 3 \quad (\text{عدد مرات التحلل})$$


$$\therefore t_{\frac{1}{2}} = \frac{t}{D} = \frac{45}{3} = 15 \text{ days}$$



(٢) عينة من الخشب تحتوى على 9×10^{16} ذرة ذرة كربون 14 عمر النصف له 5600 years ما عدد أنوية الكربون 14 التي تظل موجودة في عينة الخشب بعد مرور 16800 years ؟

$$D = \frac{t}{t_{\frac{1}{2}}} = \frac{16800}{5600} = 3$$

الحل :




$$\therefore \text{عدد الأنوية التي تظل موجودة في عينة الخشب} = 1.125 \times 10^{16} \text{ atom}$$

(٣) احسب عمر النصف لعنصر مشع تتحلل 75% من أنوبيته بعد مرور 12 min

$$25\% = 75\% - 100\% = 100\% - 75\%$$

الحل : ∵ 75% من الأنوية قد تحولت.



$$\therefore D = 2$$

$$\therefore t_{\frac{1}{2}} = \frac{t}{D} = \frac{12}{2} = 6 \text{ min}$$

(٤) عينة من عنصر مشع عدد ذراتها 4.8×10^{12} atom تحللت $\frac{7}{8}$ من كتلتها زراتها بعد مرور 9 months


(ب) عمر النصف لهذا العنصر المشع.

احسب : (١) عدد الذرات المتبقية من هذا العنصر.

$$\therefore \text{الكتلة المتبقية} = \frac{1}{8} \text{ الكتلة الأصلية}$$

الحل : (١) ∵ $\frac{7}{8}$ من الكتلة قد تحول.

$$0.6 \times 10^{12} \text{ atom} = 4.8 \times 10^{12} \times \frac{1}{8}$$



$$\therefore D = 3$$


$$\therefore t_{\frac{1}{2}} = \frac{t}{D} = \frac{9}{3} = 3 \text{ months}$$

(٥) احسب الكتلة الأصلية لعنصر مشع تبقى منه 0.0625 g بعد مرور 2.5 day

علمًا بأن عمر النصف له 0.5 day

$$D = \frac{t}{t_{\frac{1}{2}}} = \frac{2.5}{0.5} = 5$$

الحل :



$$\therefore \text{الكتلة الأصلية} = 2 \text{ g}$$

(٦) ما الزمن اللازم لتحلل 53% من أنيون عنصر مشع، فترة عمر النصف له 32 min ؟

الحل :

$$32 \text{ min} \xrightarrow{\text{تلزم لتحلل}} 50\%$$

$$? \text{ min} \longrightarrow 53\%$$


$$\therefore \text{الزمن اللازم لتحلل} = \frac{32 \times 53}{50} = 34 \text{ min}$$

(٧) كم ذرة تبقى من 1 mol من عنصر الثوريوم 234 المشع بعد مرور 72.3 days ؟
علمًا بأن عمر النصف له 24.1 days

الحل :

$$D = \frac{t}{t_{\frac{1}{2}}} = \frac{72.3}{24.1} = 3$$

\therefore عدد ذرات 1 mol من عنصر الثوريوم 234



\therefore عدد الذرات المتبقية = 0.7525×10^{23} atom

(٨) الجدول المقابل يوضح عملية تحلل 80 g من عنصر مشع خلال فترة زمنية مقدارها 8 days :

كتلة العنصر (g)	80	40	20	10	5
الزمن (day)	0	2	4	6	8

(أ) ما عمر النصف لهذا العنصر المشع ؟

(ب) ما الكتلة المتبقية من هذا العنصر بعد مرور 4 days ؟

(ج) ما كتلة الأنوية المتحللة بعد مرور 6 days ؟

(د) احسب الزمن اللازم لوصول كتلة هذا العنصر إلى 2.5 g

الحل :


(أ) \therefore كتلة العنصر (80 g) أصبحت (40 g) خلال 2 days

\therefore عمر النصف = 2 days

(ب) 20 g من الجدول مباشرةً.

(ج) \therefore كتلة العنصر المشع بعد مرور 10 g = 6 days

\therefore كتلة الأنوية المتحللة = 70 g = 10 - 80



$$\therefore D = 5$$

$$\therefore t = \frac{t}{t_{\frac{1}{2}}} \times D = 2 \times 5 = 10 \text{ days}$$

ثانياً

تفاعلات التحول النووي (العنصري)

تفاعلات التحول النووي (العنصري)

تفاعلات نووية يتم فيها قذف نواة عنصر ما (يُعرف بالهدف) بجسيم ذو طاقة حركة مناسبة (يُعرف بالقذيفة)، فتحتحول إلى نواة عنصر جديد.

* الجدول التالي يوضح بعض الأمثلة على القذائف :

النيوترون	الديوتيرون	البروتون	الألفا	القذيفة
${}_0^1 n$	${}_1^2 H$	${}_1^1 H$	${}_2^4 He$	الرمز

للايضاح فقط



* وللوصول بطاقة حركة القذيفة إلى المستوى المطلوب، يتم تسريعها باستخدام أجهزة المعجلات النووية، مثل :

- جهاز ثان دى جراف.
- جهاز السبيكلوترون.

اذكر أهمية جهاز ثان دى جراف و جهاز السبيكلوترون.



تطبيقات


استخدام جسيم الألفا ${}^4_2 He$ كقذيفة

* ينسب أول تفاعل تحول صناعي للعناصر إلى العالم رutherford عام 1919، حيث استخدم :

علامة * الموجودة أعلى يمين رمز العنصر تشير إلى أن نواة هذا العنصر غير مستقرة تتخلل خلال لحظات



- جسيمات ألفا كقذيفة.

- غاز النيتروجين كهدف، كالتالي :









* الخطوة ① :



وضوح بالمعادلات النووية تفاعل قذف نواة نيتروجين بجسيم ألفا.

استخدام البروتون ${}^1_1 \text{H}$ كقذيفة ٢

* تفاعل قذف نواة الألومنيوم 27 بقذيفة بروتون :

استخدام الديوتيريون ${}^2_1 \text{H}$ كقذيفة ٣* تفاعل قذف نواة الماغنسيوم ${}^{26}_{12} \text{Mg}$ بقذيفة ديوتيريون :

استخدام النيوترون 1n كقذيفة

* تفاعل قذف نواة الليثيوم 6 بقذيفة نيوترون :



معادلة تحول نظير الليثيوم 6 إلى نظير التريتيوم

علل : يعتبر النيوترون من أفضل القذائف.

لأنه لا يحتاج إلى سرعة عالية لاختراق النواة حيث أنه جسيم متعادل الشحنة، لا يلاقى تناهراً مع الإلكترونات المحيطة بالنواة.

موازنة المعادلات النووية

* يراعى عند موازنة المعادلات النووية تحقيق القانونين الآتيين :

- قانون حفظ الشحنة.
- قانون حفظ المادة (الكتلة).

* يقتضي قانون حفظ الشحنة أن يكون :

$$\text{مجموع الأعداد الذرية للمتفاعلات} = \text{مجموع الأعداد الذرية للنواتج}$$

«الطرف الأيسر من المعادلة النووية»، «الطرف الأيسر من المعادلة النووية»


* يقتضي قانون حفظ المادة (الكتلة) أن يكون :

$$\text{مجموع الأعداد الكتالية للمتفاعلات} = \text{مجموع الأعداد الكتالية للنواتج}$$

«الطرف الأيسر من المعادلة النووية»، «الطرف الأيسر من المعادلة النووية»



تطبيق

موازنة الشحنة والكتلة في تفاعل قذف نواة النيتروجين 14 بجسيم ألفا ${}^4_2\text{He}$



مثال

في ضوء معرفتك بتحقيق المعادلة النووية لقانون حفظ الشحنة وقانون حفظ المادة، استنتج العدد الكتلي و العدد الذري للعنصر الوليد X المجهول في المعادلتين التاليتين :




الحل :

تحقيق قانوني حفظ الشحنة والمادة	المعادلة (1)	المعادلة (2)
مجموع الأعداد الكتليلية للمتفاعلات	$235 + 1 = 236$	
مجموع الأعداد الكتليلية للنواتج	$160 + A + (4 \times 1) = 164 + A$	$102 + A + (2 \times 1) = 104 + A$
العدد الكتلي A للعنصر الوليد	$236 = 164 + A$ $\therefore A = 72$	$236 = 104 + A$ $\therefore A = 132$
مجموع الأعداد الذرية للمتفاعلات	$92 + 0 = 92$	
مجموع الأعداد الذرية للنواتج	$62 + Z + (4 \times 0) = 62 + Z$	$42 + Z + (2 \times 0) = 42 + Z$
العدد الذري Z للعنصر الوليد	$92 = 62 + Z$ $\therefore Z = 30$	$92 = 42 + Z$ $\therefore Z = 50$

ثالثاً تفاعلات الانشطار النووي

الانشطار النووي


تفاعل يتم فيه قذف نواة ثقيلة بقدمة نووية خفيفة، ذات طاقة حركة منخفضة، فتنشطر إلى نوتين متقاربتين في الكتلة، وعدد من النيوترونات وطاقة هائلة.





انشطار نووي

تطبيق تفاعل انشطار نواة اليورانيوم 235 غير المستقر

* عند توجيه قذيفة نيوترون بطيء إلى نواة اليورانيوم 235، فإنها تتحول إلى نظير اليورانيوم X، Y يطلق عليهما اسم شظايا والذى لا تزيد مدة بقاءه عن s^{-10} ، حيث يتحول إلى نوتين X، Y يتحقق قانون بقاء الكتلة.






* وهناك حوالي 90 نواة وليدة يمكن أن تنتج عن هذا الانشطار النووي، أشهرها الباريوم Ba و الكربيتون Kr :




انشطار نواة اليورانيوم 235 عند قذفها بنيوترون


* ومن أمثلة التفاعلات المحتملة لانشطار نواة اليورانيوم 235 :



التفاعل المتسلسل



التفاعل الانشطارى المتسلسل لليورانيوم 235



تصور لمفهوم التفاعل المتسلسل

علل : يستمر التفاعل المتسلسل
لتلقائيًا بمجرد بدئه.

- * تقوم النيوترونات الناتجة من التفاعلات النووية الانشطارية بدور **القذائف** لتفاعلات انشطارية مماثلة، وهكذا يستمر التفاعل الانشطارى بمجرد بدئه ولهذا يوصف بالتفاعل المتسلسل.

التفاعل المتسلسل

تفاعل نوى انشطارى، تستخدم النيوترونات الناتجة منه كقدائف،
بشكل يضمن استمراره تلقائيًا بمجرد بدئه.

- * يتولد عن التفاعل الانشطارى المتسلسل لليورانيوم 235 طاقة حرارية ضخمة ... **علل ؟**

لاستمرار عملية شطر أئونية اليورانيوم والتى تتزايد باستمرار
التفاعل نتيجة للزيادة المستمرة فى أعداد النيوترونات.

فكرة عمل المفاعلات النووية الانشطارى


- * تعتبر المفاعلات النووية الانشطارية من التطبيقات السلمية الهامة للتفاعلات الانشطارية المتسلسلة، والتفاعل الأساسى فيها هو تفاعل انشطار نواة اليورانيوم 235

* يستخدم في المفاعل كمية من اليورانيوم تساوى **الحجم الحرج** ... **علل ؟**

لضمان استمرار التفاعل المتسلسل بنفس معدله الابتدائى البطىء لإنتاج طاقة دون حدوث انفجار.

علل : لا يستخدم في المفاعلات الانشطارية كمية من اليورانيوم حجمها أكبر بكثير من **الحجم الحرج**.

* تتميز هذه المفاعلات بإمكانية التحكم في معدل حدوث تفاعلات الانشطار المتسلسل فيها عن طريق امتصاص النيوترونات بواسطة التحكم في :



التحكم في معدل تفاعلات الانشطار النووي
عن طريق قضبان الكادميوم

حيث يؤدي إزالة قضبان الكادميوم بين قضبان الوقود النووي في المفاعل النووي إلى زيادة معدل امتصاص النيوترونات، وبالتالي يقل معدل تفاعلات الانشطار، أما عند رفع قضبان الكادميوم فتحدث عملية عكسية.

(١) وضع قضبان الكادميوم بين قضبان الوقود النووي


(اليورانيوم ٢٣٥) :

حيث تؤدي زيادة عدد قضبان الكادميوم المستخدمة إلى زيادة معدل امتصاص النيوترونات، وبالتالي يقل معدل تفاعلات الانشطار.

ما النتائج المتترتبة على :

- (١) رفع قضبان الكادميوم من بين قضبان الوقود النووي في المفاعل النووي.
- (٢) زيادة عدد قضبان الكادميوم المستخدمة في المفاعل النووي.

* تستخدم الطاقة الحرارية الناتجة عن بعض التفاعلات النووية بالمفاعل النووي في تسخين الماء حتى الغليان واستغلال البخار الناتج في إدارة التوربينات لتوليد الكهرباء.



تستخدم المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة (توليد الكهرباء)
«لإيضاح فقط»

فكرة عمل القبالة الانشطارية

* تعتبر القنبلة النووية الانشطارية من التطبيقات اللاسلمية (الحربية) لتفاعلاتها الانشطارية المتسلسلة.




مودع للقنبلة التي أقيمت على مدينة بجازاكي
في 9 أغسطس 1945

٢٣٥ يستخدم في القنبلة الانشطارية كمية من اليورانيوم

أكبر بكثير من الحجم الحرج ... **عل؟** لضمان استمرار التفاعل
الانشطاري بمعدل سريع وهو ما يؤدي إلى حدوث انفجار.

تفاعلات الاندماج النووي

الاندماج النموى




اندماج نووی


عملية دمج نوافتين خفيفتين، لتكوين نواة عنصر آخر أثقل من أي منها وكتلتها أقل من مجموع كتل الأنوية المندمجة.

* وتعتبر التفاعلات النووية الاندماجية مصدر الطاقة المدمرة للقنبيلة الهيدروجينية.

تطبیق



عملية اندماج ديوتيرونان




كتلة النموذج الناتجة

أقل من مجموع كتل الأنوية المندمجة

* عند اندماج ديوتيرونان H^2 معًا، تكون كثافة النواتج أقل من كثافة المتفاعلات ... علل؟

التحول الفرق في الكتلة إلى طاقة مقدارها 3.3 MeV




علل : حدوث تفاعلات نووية اندماجية داخل نجم الشمس وصعوبة تحقيق ذلك في المختبرات.
لأن التفاعلات النووية الاندماجية تتم عند درجة حرارة مرتفعة جداً من رتبة 10^7 درجة كلفينية (مطلقة).

قارن بين التفاعلات الكيميائية و التفاعلات النووية.

التفاعلات النووية	التفاعلات الكيميائية
تتم بين أنوية ذرات العناصر المتفاعلة عن طريق نيوكلونات (مكونات) النواة	تتم بين ذرات العناصر المتفاعلة عن طريق إلكترونات مستويات الطاقة الخارجية
تؤدي إلى تحول العنصر إلى نظيره أو إلى عنصر آخر	لا تؤدي إلى تحول العنصر إلى عنصر آخر
نظائر العنصر الواحد تعطى نواتج مختلفة	نظائر العنصر الواحد تعطى نفس الناتج
تكون مصحوبة بانطلاق كميات هائلة من الطاقة	تكون مصحوبة بانطلاق أو امتصاص قدر محدد من الطاقة

الخدمات السلمية للنظائر المشعة

المجال	الاستخدام السلمي
مجال الطب	<ul style="list-style-type: none"> * قتل الخلايا السرطانية، عن طريق : • توجيه أشعة جاما المنبعثة من نظير أيّاً من الكوبالت 60 أو السيرزيوم 137 المشعين إلى مركز الورم (الهدف). • غرس إبر تحتوى على نظير الراديوم 226 المشع في الورم السرطاني. <p>استخدام أشعة جاما في قتل الخلايا السرطانية</p>



عملية صب الصلب المنشهر

* التحكم الآلى فى بعض خطوط الإنتاج كما يحدث عند صب الصلب المنشهر، حيث يتم وضع مصدر لأشعة جاما، مثل نظير الكوبالت 60، أو نظير السيريوم 137 عند أحد جوانب الإناء الذى يصب فيه وعلى الجانب الآخر كاشف إشعاعى حساس لأشعة جاما، وعندما تصل كتلة الصلب إلى حد معين، لا يستطيع الكاشف استقبال أشعة جاما، فتوقف عملية الصب.

مجال
المصانعة




عينتان من الفراولة قررت كهما في الهواء
مدة ٣ أيام
(العينة اليسرى قررت عرضها لأشعة جاما)

* إحداث طفرات بالأجنة وانتخاب الصالح منها لإنتاج نباتات أكثر إنتاجية ومقاومة للآفات الزراعية، وذلك عن طريق تعريض البذور لجرعات مختلفة من أشعة جاما.

* تعقيم ذكور الحشرات باستخدام أشعة جاما ... **عل؟** للحد من انتشار الآفات الزراعية.

* تعقيم المنتجات النباتية والحيوانية باستخدام أشعة جاما ... **عل؟**
لحفظها من التلف، وإطالة فترة تخزينها.

مجال
الزراعة



* تتبع مسار (دورة) بعض المواد في النبات بإدخال نظائر مشعة في المواد الأساسية التي يستخدمها النبات، ثم تتبع الإشعاعات الصادرة منها لمعرفة دورتها في النبات كإدخال ماء به أكسجين مشع $^{18}O_8$ وتتبع أثره.

مجال
البحوث العلمية

الآثار الضارة للإشعاعات النووية

يوجد نوعان من الإشعاعات، هما :

الإشعاعات المؤينة

الإشعاعات غير المؤينة

١

الإشعاعات المؤينة

الإشعاعات المؤينة

الإشعاعات التي تحدث تغيرات في تركيب الأنسجة التي تتعرض لها.

- * تسمية الإشعاعات المؤينة بهذا الاسم ... علل؟
لأنه عند سقوطها على أي جسم، تتصادم مع الذرات المكونة له، مسببة تأينها.

أمثلة:

- أشعة ألفا (α).
• أشعة بيتا (β).
• الأشعة السينية (X-ray).
• أشعة جاما (γ).

أضرارها:


- * عند سقوط إشعاع مؤين على الخلية الحية، فإنه يؤدي إلى تأين جزيئات الماء - التي تمثل الجزء الأكبر من تركيبها - مما يؤدي إلى تلف الخلية وتكسير الكروموسومات الموجودة بداخلها وإحداث بعض التغيرات الجينية بها.

* استمرار التعرض للإشعاعات المؤينة يؤدي إلى :


- منع أو تأخير انقسام الخلايا أو زيادة معدل انقسامها، وهو ما يؤدي إلى تكون الأورام السرطانية.
- حدوث تغيرات مستديمة في الخلايا، تنتقل وراثياً إلى الأجيال التالية، وتكون النتيجة ظهور أجيال جديدة، تحمل صفات مخالفة لصفات الأبوين.
- موت الخلايا.

ما النتائج المتترتبة على :


- (١) سقوط إشعاع مؤين على الخلية الحية.
- (٢) استمرار تعرض الخلايا للإشعاعات المؤينة لفترة زمنية طويلة.



مدى نفاذية الإشعاعات المؤينة
في جسم الإنسان



الإشعاع المؤين يُدمر الكروموسومات




تسبب الإشعاعات المؤينة
في تكوين الأورام السرطانية

الإشعاعات غير المؤينة

الإشعاعات غير المؤينة

الإشعاعات التي لا تحدث تغيرات في تركيب الأنسجة التي تتعرض لها.



أشعة ليزر


أمثلة:

- أشعة الراديو «التي تتبعث من الهواتف المحمولة».
- الأشعة تحت الحمراء.
- أشعة الميكروويف.
- أشعة فوق البنفسجية.
- الضوء المرئي.

أضرارها:



الإشعاعات الصادرة من أبراج تقوية المحمول



وضع اللاب توب على الركبتين
يؤثر على المخصوصة

* الإشعاعات الصادرة من أبراج تقوية المحمول قد تسبب تغيرات فسيولوجية في الجهاز العصبي

تظهر على هيئة:

- صداع.
 - إعياء.
 - دوار (دوخة).
- وقد يصل الأمر إلى فقدان الذاكرة،

لذلك اتفق العلماء على أن المسافة الآمنة بين

المساكن وأبراج التقوية يجب ألا تقل عن 6 m

* المجال المغناطيسي والكهربى لأشعة الراديو الصادرة من الهاتف المحمول يؤثر على خلايا الجسم، بالإضافة إلى أن امتصاص خلايا الجسم لهذه الأشعة يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها.

* وقد أشارت بعض الابحاث إلى أن وضع الحاسب المحمول (اللاب توب) على الركبتين يؤثر على المخصوصة.

• اذكر بعض الأمثلة للأشعة غير المؤينة.

• وضح الآثار الضارة للإشعاعات الصادرة من :

- اللاب توب.
- الهاتف المحمول.







نحوذج بوكليت على الباب الخامس

١٠ درجات

١٠ اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة من :

١ تتبّع حزمة من الدقائق من عنصر مشع لتمر خلال قطبي مجال كهربى، أيًّا من هذه الاختيارات تعبّر عن المسار الصحيح لهذه الدقائق ؟



٢ كل الجسيمات الآتية مشحونة، عدا
 د البروتون. ج النيوترون. ب جسيم بيتا. ١ جسيم ألفا.

٣ العناصر الآتية لها نظائر مشعة .. أيًّا منها يعتبر مصدرًا للطاقة بسبب نشاطه الإشعاعي ؟
 د اليورانيوم. ج اليود. ب الهيدروجين. ١ الكربون.

٤ أيًّا من الاختيارات الآتية تعبّر تعبيرًا صحيحاً عن الكواركات المكونة للبروتون والنيوترون ؟




ال اختيار	١	٢	٣	٤
البروتون	د	ج	ب	١
النيوترون	١	ب	ج	د

٥ أيًّا من الاختيارات الآتية تعبّر تعبيرًا صحيحاً عن أشعة جاما وجسيم بيتا ؟

ال اختيار	أشعة جاما	جسيم بيتا
١	سرعتها كبيرة جداً	من الموجات الكهرومغناطيسية
ب	من الموجات الكهرومغناطيسية	نواة ذرة الهيليوم
ج	من الموجات الكهرومغناطيسية	قدرته على النفاذ متوسطة
د	سرعتها كبيرة جداً	لا تتأثر بال المجال الكهربى



كل مما يأتي من تفاعلات الاندماج النووي، عدا



٦

- من وسائل قتل الخلايا السرطانية، غرس إبر فيها تحتوى على نظير
 (ا) الراديوم 226 الذى يشع جسيمات ألفا.
 (ب) الكوبالت 60 الذى يشع أشعة جاما.
 (ج) السيرزيوم 137 الذى يشع أشعة جاما.
 (د) السترانشيوم 90 الذى يشع جسيمات بيتا.

٧

- تعتمد فكرة عمل القنبلة الانشطارية على
 (ا) استخدام كمية من اليورانيوم 238 أكبر من الحجم الحرج.
 (ب) حدوث تفاعل متسلسل لنظير اليورانيوم 235
 (ج) وضع قضبان من الكادميوم بين قضبان اليورانيوم 235
 (د) حدوث تفاعل انشطارى بمعدل سريع يؤدى إلى انفجار ذرات اليورانيوم 238


٨

- أشهر كل العلماء الآتين فى وصف تركيب الذرة، عدا العالم
 (ا) أينشتين.
 (ب) رذرфорد.
 (ج) بور.
 (د) شادويك.

٩

- إذا علمت أن كتلة النيوترون = u 1.00866 وكتلة البروتون = u 1.00728 وطاقة الترابط النووي لكل نيوكلون في نواة السيليكون ${}_{14}^{28}\text{Si}$ تساوى MeV 8.21275 ما قيمة الكتلة الفعلية لنواة نظير السيليكون 28 ؟
 (ا) 28.22316 u (ب) 27.97616 u (ج) 229.957 u (د) 279.7616 u

١٠



اكتب المعادلة النووية الموزونة المعبرة عن

العملية الموضحة بالشكل البياني المقابل.

علمًا بأن :

• العدد الذري لنظير Pd يساوى 46

• العدد الذري لنظير Ag يساوى 47

١١

الكتلة الذرية النسبية	النسبة المئوية في الطبيعة	النظير
23.985 u	78.99%	$^{24}_{12}\text{Mg}$
24.986 u	10%	$^{25}_{12}\text{Mg}$
25.983 u	11.01%	$^{26}_{12}\text{Mg}$

١ درجة


١٢ احسب الكتلة الذرية لعنصر الماغنيسيوم Mg

من الجدول المقابل،

١٣

١٤ ما الكتلة المتبقية من g 400 من عينة مشعة بعد مرور 5 فترات عمر نصف عليها؟

١٤



إذا كان الفرق بين كتلة النواة والتفاعلات يساوى g 0.003

١٤

احسب كمية الطاقة الناتجة مقدرة بوحدة الجول (J).

١٤

١٥ حدد موقع الأذونية غير المستقرة الآتية بالنسبة لجزام الاستقرار مع التفسير.

١٥


ثم حدد نوع الإشعاع الصادر عنها للوصول إلى حالة الاستقرار

(١) النيون 24 ($^{24}_{10}\text{Ne}$)(٢) الكلور 32 ($^{32}_{17}\text{Cl}$)

?

لماذا ينفجر على الأرض عذاب

الشكل الذي يغير عن تسلية تحول عنصرى



(١) اكتب المعادلة النووية الموزونة المعبرة عن التفاعل الحادث.

(٢) هل النواة الوليدة مستقرة أم غير مستقرة؟ مع التفسير.

استخدم العناصر والنظائر الآتية في كتابة معادلتين مختلفتين تعبران تعبيراً صحيحاً عن تفاعلين نووين.
يمكن استخدام بعض العناصر والنظائر أكثر من مرة.

٣



ما هو الماء؟

